


## Определение рН сильных кислот и оснований

Степень диссоциации ( $\alpha$ ) сильных кислот в процентах равна 100% или в долях единицы равна 1. Для слабых кислот и оснований  $\alpha$  меньше 1 (или меньше 100%).

1. Для растворов сильных кислот (например для соляной) справедливо:



2. Для растворов сильных оснований (например для гидроксида натрия):



- **Определение pH слабых одноосновных кислот**

- 3. Для растворов **слабых одноосновных кислот** (например, для фтористоводородной кислоты HF) следует учитывать степень диссоциации слабой кислоты ( **$\alpha$** ), тогда :
- **$[H^+]$ , г-ион/л =  $\alpha$  x [HF], г-моль/л.**

- 
- **Определение рН слабых оснований**
- Для растворов слабых оснований (например, для гидроксида аммония,  $\text{NH}_4\text{OH}$ )
- следует так же учитывать степень диссоциации этого слабого основания ( $\mathbf{i}$ ), тогда
- $[\text{OH}^-], \text{ г-ион/л} = \mathbf{i} \times [\text{NH}_4\text{OH}], \text{ г-моль/л.}$

# Определение рН слабых кислот и оснований

- Также для любой слабой кислоты (HF) или основания можно записать константу диссоциации данного соединения (K) следующим образом:
  - $K_{HF} = [H^+] \times [F^-] / [HF]$ , а поскольку :  $[HF] = [H^+] + [F^-]$ ,
  - $[H^+] = [F^-]$ , то константу реакции можно записать:
  - $K_{HF} = [H^+] \times [H^+] / [HF] = [H^+]^2 / [HF]$ , и отсюда
  - $[H^+]^2 = K_{HF} \times [HF]$ , и, тогда,  $[H^+] = \sqrt{K_{HF} \times [HF]}$ ,

## Определение рН слабых кислот

- Для растворов **слабых многоосновных кислот** ( например, **угольной  $\text{H}_2\text{CO}_3$**  ) диссоциация по первой ступени происходит значительно лучше чем по последующим. Поэтому концентрацию  $\text{H}^+$  в растворе определяет, главным образом, константа диссоциации первой ступени ( $K_1$ ):
  - $\text{H}_2\text{CO}_3 = \text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \quad K_1 = 4,45 \times 10^{-7}$
  - $\text{HCO}_3^- = \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-} \quad K_2 = 4,69 \times 10^{-11}$  , видно, что  $K_2$  на несколько порядков меньше  $K_1$  , поэтому концентрацию  $\text{H}^+$  определяют по следующей формуле:
  - $[\text{H}^+] = \sqrt{K_1 \times [\text{H}_2\text{CO}_3]}$ ,

# Определение рН и рОН слабых кислот

- **Задача №9.** Имеется 0,1 М раствор HF. Степень диссоциации кислоты составляет  $\alpha = 8,5\%$ . Требуется определить рОН раствора.
- **Решение:** Применим ранее написанную формулу:
- $[H^+], \text{ г-ион/л} = \alpha \times [HF], \text{ г-моль/л} = 0,085 \times 0,1 = 8,5 \times 10^{-3}$
- $pH = -\text{Lg} [H^+] = -\text{Lg} [8,5 \times 10^{-3}] = 3 - \text{Lg} 8,5 = 3 - 0,92 = 2,08$
- $pOH = 14 - 2,08 = 11,92$

## Определение рН и рОН слабых кислот

- **Задача №10.** Имеется 0,1% раствор слабой уксусной кислоты. Константа диссоциации уксусной кислоты  $K = 1,75 \times 10^{-5}$
- Требуется определить рН и рОН данного раствора.
- **Решение :** По аналогии с пред идущими задачами % переводим
- в г/л, затем в г-моль/л, предварительно определив молекулярную массу уксусной кислоты:
- М.м.  $\text{CH}_3\text{COOH} = 12+3+12+16 \times 2+1=60$  г-моль;
- 0,1% р-р = 1 г/л =  $1/60 = 0,017$  г-моль/л =  $1,7 \times 10^{-2}$  г-моль/л;
- Далее применим раннее обозначенную формулу:
- $[\text{H}^+] = \sqrt{K_{\text{HF}} \times [\text{HF}]}, = \sqrt{1,75 \times 10^{-5} \times 1,7 \times 10^{-2}} = \sqrt{2,97 \times 10^{-7}} = \sqrt{29,7 \times 10^{-8}} = 5,45 \times 10^{-4}$  г-ион/л;
- $\text{pH} = -\text{Lg} [\text{H}^+] = -\text{Lg} [5,45 \times 10^{-4}] = 4 - \text{Lg} 5,45 = 4 - 0,74 = 3,26$
- $\text{pOH} = 14 - 3,26 = 10,74$