

Ферритин и железодефицитная анемия (1)

- **Железодефицитная анемия (ЖДА) —** гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляющийся анемией и сидеропенией.
- Основными причинами ЖДА являются кровопотери и недостаток богатой гемом пищи — мяса и рыбы.

Распространенность железодефицитной анемии в мире по данным ВОЗ (2008 г.)

- Средняя распространенность
железодефицитной анемии – 24,8%
- Размах: от 12,7% (у мужчин) до 47,4% (у
детей дошкольного возраста)
- <http://www.cirlab.ru/analis/about/anemia/>

Laboratory diagnosis of iron-deficiency anemia: an overview.

Guyatt G.H., Oxman A.D., Ali M., Willan A., McIlroy W., Patterson C.

J. Gen. Intern. Med. 1992; 7:145-53

Проверяемый диагностический тест: содержание ферритина в сыворотке крови	ЖДА согласно эталону сравнения		Всего
	Наличие ЖДА	Отсутствие ЖДА	
< 65 мМоль/мл	731	270	1001
> 65 мМоль/мл	78	1500	1578
Всего	809	1770	2579

Пригодно ли обнаружение низкого содержания ферритина (65 мМоль/мл) для диагностики наличия ЖДА?

Пригодно ли обнаружение высокого содержания ферритина (> 65 мМоль/мл) для для диагностики отсутствия ЖДА?

Каковы чувствительность и специфичность такой диагностики ЖДА?