

**«Астана медицина университеті» АЕҚ
Балалар жұқпалы аурулары кафедрасы**

СӨЖ

Тақырыбы: «SARS-CoV-2 ПТР-де мұрын-жұтқыншақ пен ауыз-
жұтқыншақтан жағынды алу техникасы»

**Орындаған: Ибағарова А.М.
Керімхан А.Б
Имангазиева А.К**

**Топ: 634 ЖМ
Тексерген: Хамитова Меруерт Ойлановна**

Нұр-Сұлтан қ. 2021 жыл

Жоспар


- Кіріспе
- Негізгі бөлім
- -мұрын-жұтқыншақтан жағынды алу
- Ауыз-жұтқыншақтан жағынды алу
- Қорытынды



Жұтқыншақ пен мұрыннан тампон алу үшін мыналарды дайындау керек




- ❖ медицина қызметкеріне арналған жеке қорғану құралдары (ЖҚҚ) — бір реттік қосымша халат, бас киім, маска немесе респиратор, қорғаныс көзілдірігі немесе қалқан,
 - ❖ Қос қолғап
 - ❖ зерттеуге жолдама
 - ❖ бланкісі пробиркаларға арналған штативстерильді зонд-тампондар көлік ортасы бар пробиркаларстерильді қалақшашыны график немесе өшірілмейтін маркер
 - ❖ дезинфекциялық ерітінділері бар ыдыстар
-



-
- SARS-CoV-2 ПТР-де мұрын-жұтқыншақ пен ауыз-жұтқыншақтан жағынды алуға қарсы көрсеткіш:
 - абсолютті-жоқ. Салыстырмалы:
 - ❖ аузын аша алмаужарақат,
 - ❖ күйік тұлғаларбас сүйек сүйектерінің анатомиялық кемістігі
 - ❖ ауыр түрдегі геморрагиялық диатез
-
- 

Жағынды алуға жиынтық

- стерильді флокирленген немесе стандартты пластикалық зондтар-дакрон, вискоза немесе жасанды жібек тампондары бар тампондар.
- зонд-тампонның ұшын батыруға мүмкіндік беретін көлемде стерильді буферленген 0,9% NaCl ерітіндісі бар пробиркалар .



Жағынды алу алгоритмі:

- Қолыңызды гигиеналық жолмен жуыңыз
 - Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз
 - Өзіңізді пациентке таныстырыңыз Науқастың жеке басын анықтау
 - Рәсімді өткізуге ақпараттандырылған келісім бар екеніне көз жеткізу
 - Науқасқа процедураның мақсаты мен барысын түсіндіріңіз
 - Зерттеуге жолдама бланкісін толтыру Түтіктерді белгілеу
 - Науқасқа жарық көзіне ыңғайлы отыруға кеңес беріңіз
-



Ауыз-жұтқыншақтан жағынды алу:

- Коронавирусыға арналған ауыз және жұтқыншақтан алынған материалды аш қарынға және дәрі қабылдағанға дейін немесе тамақтанғаннан кейін 2 сағаттан ерте емес қабылдау керек. Әдістеме келесідей:
 - ❖ Науқастан басын сәл артқа тастауды сұраңыз
 - ❖ Сол қолға стерильді дымқыл зондпен пробирканы және стерильді қалақшаны алу
 - ❖ Науқастан аузын ашуды сұраңыз
 - ❖ Сол қолыңызбен тілдің тамырына басыңыз, оң қолыңызбен пробиркадан стерильді зондты алыңыз
 - ❖ Тістерге, тілдің шырышты қабығына және щекке тигізбестен, айналмалы қозғалыстармен доғалар мен бездердің бойымен зондты, қажет болған жағдайда жұтқыншақтың артқы қабырғасын жүргізіңіз.
-








Мұрын-жұтқыншақтан жағынды алу:

- ❖ Науқастан мұрын жолдарын тазартуды және басын сәл артқа тастауды сұраңыз
 - ❖ Сол қолыңызға құрғақ зондпен пробирканы алыңыз, оң қолыңызға құрғақ зондты пробиркадан алыңыз
 - ❖ Алдыңғы мұрын тампоны. Жеңіл айналмалы қозғалыспен зондты мұрынның сыртқы қабырғасы бойымен төменгі мұрын қабығына дейін 1-3 см тереңдікке енгізіңіз.
 - ❖ Мұрын қанаттарының терісіне тигізбеңіз
 - ❖ !Жұтқыншақтың артқы қабырғасынан мұрын тампоны. Ол SARS-CoV-2-де материалды алу үшін қолданылады (коронавирустық инфекцияның қоздырғышы).
 - ❖ Зондты 1-3 см енгізгеннен кейін зондты сәл төмен түсіріп, төменгі мұрын қабығының астына назофаринстің артқы қабырғасына мұқият енгізіңіз (балаларда 3-4 см және ересектерде 5-6 см). Зондты айналмалы қозғалыстармен де алыңыз. Түтіктің шеттеріне тигізбестен, оған зонд салыңыз.
-





Материальды сақтау:

- Салқындату элементтері бар арнайы термоконтейнерде немесе +2 – ден +8 °С-қа дейінгі температурада термоста-24 сағат ішінде.

