

Удивительное животное Австралии

Малый кроличий бандикут

Научная классификация

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Млекопитающие

Отряд: Бандикуты

Семейство: Кроличьи бандикуты
(Thylacomyidae)

Род: Кроличьи бандикуты

Вид: Малый кроличий бандикут



Ареал

Обитание

Впервые малый кроличий бандикут был описан британским зоологом Олдфилдом Томасом в 1887 году. Образцом ученому послужил единственный экземпляр яллары, хранившийся в то время в коллекции Британского Музея. а почти полвека, прошедшие с тех пор и до 1931 года, зоологам попало в руки всего двенадцать малых кроличьих бандикутов, изучение которых так и не смогло дать ответы на все имевшиеся вопросы. Были широко распространены в центральных районах Австралии. Последняя находка была сделана в 1967 г., когда в гнезде орла в центре Австралии был обнаружен череп малого кроличьего бандикута.

Образ жизни и биология

Населяют аридные места, песчаные равнины, покрытые редкой растительностью, небольшими солянками. Держатся поодиночке. Активны ночью. Убежищем служат норы глубиной до 1—2 м, закрытые изнутри. Животные выкапывают их сами. Поедают в основном грызунов, а также семена. Ночью они охотились на муравьев, термитов, мелких грызунов, собирали корни и семена, а днем отдыхали в своих прохладных убежищах, предусмотрительно засыпав вход песком. Период размножения приходится на март — май, но обычно регулируется выпадающими осадками и доступностью пищи. В помете 1—3 детеныша.

