## Кабардино-Балкарский государственный университет им. X. M. Бербекова Медицинский факультет

Кафедра ортопедической стоматологии

Зав.кафедрой: Балкаров А.О.

Соавтор: Карданова С.Ю.

# \* Ошибки при изготовлении съёмных протезов. >>

- Ошибки конструкции частичного съемного пластиночного протеза:
- 1. Занижение межальвеолярной высоты.

#### При внешнем осмотре:

- Старческое лицо,
- Нижняя треть лица снижена,
- Выражены носогубные складки,
- Подбородок выдвинут вперёд,
- Красная кайма губ уменьшена.
- Восковую пластинку разогревают, накладывают на искусственные зубы нижней челюсти, просят пациента сомкнуть зубы и, таким образом, восстанавливают необходимую высоту нижнего отдела лица.
- В лаборатории вновь производят постановку зубов.

- Ошибки конструкции частичного съемного пластиночного протеза:
- 2. Завышение межальвеолярной высоты.

#### При внешнем осмотре:

- Напряжение мягких тканей лица
- Сглаженность носогубных складок.

#### В полости рта:

- Плотный фиссурно бугорковый контакт зубов
- Техник изготавливает восковые шаблоны (ВШ) с прикусными (окклюзионными) валиками.
- Врач вновь определяет межальвеолярную высоту и фиксирует положение челюстей центральной окклюзии.

- Ошибки конструкции частичного съемного пластиночного протеза:
- 3. Смещение нижней челюсти:
- ✓ Назад;
- ✓ Влево и вправо.

#### В полости рта:

- При смыкании челюстей прогеническое соотношение зубных рядов.
- Изготовление заново воскового базиса с окклюзионными валиками,
- Повторение этапа определения и фиксации челюстей в положении центральной окклюзии.

- Ошибки конструкции частичного съемного пластиночного протеза:
- 4. Деформация верхнего и нижнего восковых шаблонов

#### При осмотре:

- Завышение прикуса с неравномерным и неопределённым бугорковым контактом боковых зубов,
- Просвет между фронтальнымми зубами.
- Техник изготавливает новый шаблон с прикусными валиками,
- Врач вновь определяет центральную окклюзию.

 Фиксация центрального соотношения челюстей с одновременным раздавливанием базиса или окклюзионного валика.

### При осмотре:

- При установлении таких базисов на модели видно, что они неплотно прилегают к последним.
- В клинике данная ошибка проявляется в виде повышения прикуса с неравномерным и неопределенным бугорковым контактом боковых зубов, просветом в области передних зубов.

Ошибки могут возникать в случаях, если окклюзионные валики не укреплены дугообразными проволоками, альвеолярная часть на нижней челюсти очень узкая

- Исправляется ошибка переопределением центрального соотношения челюстей при помощи новых валиков, часто с жесткими базисами.



