

Министерство здравоохранения Иркутской области
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БРАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ОГБПОУ БМК)

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС

Выполнил:

Джобирова Баргигул Мухаммадшарифовна

Проверил:



Федоровская Ксения Владимировна

Определение и этиология

- ▶ Генитальный герпес – вирусное поражение слизистой половых органов, характеризующееся появлением группы пузырьков, а затем эрозий и язвочек, сопровождается местным чувством жжения и явлениями интоксикации.

К факторам риска относят внутренние причины:



- ▶ снижение иммунной защиты организма
- ▶ наличие заболеваний передающихся половым путем
- ▶ пол человека (женщины болеют генитальным герпесом чаще мужчин)
- ▶ хирургическое прерывание беременности
- ▶ использование внутриматочных спиралей



Пути передачи и формы проявления генитального герпеса

Пути передачи вируса герпеса возможна:


- ▶ половым путем при сексуальном контакте
- ▶ воздушно – капельным путем
- ▶ вертикальным путем от больной матери плоду
- ▶ восходящим путем с наружных половых органов
- ▶ при самозаражении – аутоинокуляции
- ▶ бытовым путем – через влажные предметы гигиены



Клинические проявления генитального герпеса

К ранним симптомам первичного генитального герпеса относятся



- ▶ отечность
- ▶ покраснение
- ▶ боль
- ▶ жжение в зоне входных ворот инфекции
- ▶ подъем температуры
- ▶ недомогание
- ▶ головная и мышечная боль
- ▶ герпетические высыпания
- ▶ образование болезненных эрозивно-язвенных элементов



Классификация генитального герпеса


По локализации герпетических высыпаний выделяют 3 стадии

- ▶ I стадия генитальный герпес поражает наружные половые органы.
- ▶ II стадия генитальный герпес поражает влагалище, шейку матки, уретру.
- ▶ III стадия генитальный герпес поражает матку, придатки, простату.



Генитальный герпес у беременных и новорожденных

- ▶ У беременных имеется вероятность возникновения пороков развития плода, поражая в основном нервную ткань плода, генитальный герпес повышает угрозу самопроизвольного выкидыша, преждевременных родов и его гибели.
- ▶ Обычно при вирусе герпеса у новорожденных поражаются глаза, слизистая рта, кожа, дыхательные пути, после первичного инфицирования новорожденного вирусом герпеса распространяется в организме гематогенным или контактным путем, вероятность заражения повышается при инфицировании матери генитальным герпесом в последнем триместре.



Диагностика и лечение генитального герпеса

- ▶ Методы обнаружения вируса в материале пораженных органов
- ▶ Метод выращивания вируса на культуре тканей
- ▶ Методы обнаружения антител к вирусу в сыворотке крови
- ▶ Метод иммуноферментного анализа

К классическим противовирусным препаратам

- ▶ ациклические нуклеозиды – вал ацикловир, ацикловир.
- ▶ препараты интерферона, интерферон обладает мощным антивирусным действием, и его дефицит является одной из причин рецидивов герпеса



Профилактика генитального герпеса

Способы профилактики заражения генитальным герпесом

- ▶ использование презервативов при случайных половых контактах
- ▶ применение антисептиков, для обработки участков кожи
- ▶ соблюдение интимной гигиены и гигиены половой жизни
- ▶ своевременное выявление и лечение венерических болезней
- ▶ своевременное посещение врача

