



***Абсорбционная
спектроскопия белков
(диагностики заболеваний)***



УФ спектры ароматических аминокислот: феналанина, триптофана, и тирозина

Спектры поглощения крови




гемовые белки

Гемовые белки играют жизненно важную роль в физиологии млекопитающих. Они хранят и транспортируют кислород в кровотоке и транспортируют электроны в митохондриях для синтеза высокоэнергетических молекул, используемых для управления клеточными процессами.

Гем-белки могут нести до четырех молекул кислорода, при этом конформация белка различается в зависимости от присутствия молекулы кислорода и количества связанных молекул кислорода. Таким образом, спектроскопия является полезным инструментом для измерения уровня кислорода в крови. Это важно во множестве медицинских применений, включая ситуации, когда пациенты находятся в состоянии седативного действия, находятся в коме или иным образом не могут выразить тошноту или обморок, которые являются общими признаками низкой оксигенации крови


Гемы (от др.-греч. αἷμα — «кровь») — комплексные соединения порфиринов с двухвалентным железом



Гем эритроцита

Миоглобин


Кислородосвязывающий белок скелетных мышц и мышцы сердца. Функция миоглобина заключается в создании в мышцах кислородного резерва, который расходуется по мере необходимости, восполняя временную нехватку кислорода




Миоглобин


Цитохром с

Небольшой гем-содержащий белок, относится к классу цитохромов, содержит в структуре гем типа с. Выполняет в клетке две функции. Является одноэлектронным переносчиком, свободно связанным с внутренней мембраной митохондрий, и необходимым компонентом дыхательной цепи.. С другой стороны, при определённых условиях он может отсоединяться от мембраны, переходить в раствор в межмембранном пространстве.




Absorbance Spectra of Heme Proteins






Окисление атома железа в гемовой группе металлопротеинов привело к спектрам, соответствующим метгемоглобину.



Окисление атома железа в гемовой группе металлопротеинов привело к спектру, согласующимся с метмиоглобином.



Спектр поглощения цитохрома с после окисления



Люминесценция

Люминесценция – свечение атомов, молекул, ионов и других более сложных комплексов, возникающее в результате электронного перехода в этих частицах при их возвращении из возбужденного состояния в основное

Классификация процессов люминесценции

классификация типов люминесценции

```
graph TD; A[классификация типов люминесценции] --- B[продолжительность процесса]; A --- C[виды возбуждения]; A --- D[кинетика люминесценции];
```

продолжительность процесса

виды возбуждения

кинетика люминесценции


Виды возбуждения

- Фотолюминесценция
- Катодолюминесценция
- Хемилюминесценция
- Рентгенолюминесценция


Длительность


- **Флуоресценция**
- **Фосфоресценция**
- **Замедленная
флуоресценция**

Кинетика










Принцип Франка-Кондона





Спектры







I/V

1,0

• Не
спі
лю
дл
воз
све

0,5




450

500


550

600

λ nm



• Γ
c



Спектральные закономерности люминесценции

- Универсальное соотношение Степанова



$$\frac{I}{\alpha} = D(T) \nu^3 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)$$

Спектральные закономерности люминесценции

- Независимость спектра люминесценции от длины волны возбуждающего света
- Закон Стокса-Люммеля
- Правило зеркальной симметрии
- Универсальное соотношение Степанова



Квазилинейчатые спектры поглощения и люминесценции

- Эффект Шпольского




Квазилинейчатые спектры поглощения и люминесценции

- Основные принципы селективной спектроскопии




Квазилинейчатые спектры поглощения и люминесценции

- «Спектры выжигания»




Закон Вавилова



Флуоресценция из высших возбужденных состояний


Вещество	Растворитель	$V_{\text{кв}}$
9-Фенилакридин	этанол	$1 \cdot 10^{-5}$
9,10-Ди-н-пропилаантрацена	гептан	$3 \cdot 10^{-5}$
Акридин	этанол	$4 \cdot 10^{-5}$
N-Метилакридон	этанол	$5 \cdot 10^{-5}$
1,2-Бензантрацен	гексан	$1 \cdot 10^{-4}$

Поляризованная люминесценция




Формула Левшина-Перрена



$$P = \left(3 \cos^2 \alpha \right)$$




Вращательная деполяризация



Поляризационные диаграммы




Поляризационные спектры



$$\frac{dN_2(t)}{N_2(0)} = Ae^{-At} dt$$

Законы затухания люминесценции

$$\frac{dN_2(t)}{N_2(0)} = Ae^{-At} dt$$



$$\frac{dN_2(t)}{N_2(0)} = Ae^{-At} dt$$

Законы затухания люминесценции

$$\tau = \frac{1}{A}$$

$$\frac{dN_2(t)}{N_2(0)} = Ae^{-At} dt$$

<i>Соединение</i>	<i>Растворитель</i>	$\tau_{фл}$, нс
9-Аминоакридин	этанол	15,2
Антрацен	гексан	5,75
Альбумин сыворотки	вода	4,5
Флуоресцеин	0,1 н. NaOH	4,5
Профлавин	вода	4,5
Антрацен	бензол	4,26
Рибофлавин	вода	4,2
Родамин 6Ж	этанол	4,2
	вода	3,9
Индол	вода	2,7
Триптофан	вода	2,6

$$\frac{dN_2(t)}{N_2(0)} = Ae^{-At} dt$$

Значения квантового выхода $V_{\text{кв}}$ и среднего времени возбужденного состояния эритрозина в различных растворителях



Растворитель	$V_{\text{кв}}$	$\tau_{\text{фл}}$ (нс)
Ацетонитрил	0,33	1,68
Изопропанол	0,13	0,82
Пропанол	0,09	0,47
Бутанол	0,06	0,34
Глицерин	0,05	0,211

$$\frac{dN_2(t)}{N_2(0)} = Ae^{-At} dt$$


Кинетика затухания анизотропии излучения

$$I_{\perp}(t) = \exp\left(-t/\tau_{\text{фл}}\right) \left[1 - r_0 \exp\left(-t/\tau_{\text{вр}}\right)\right]$$

$$I_{\text{р}}(t) = \exp\left(-t/\tau_{\text{фл}}\right) \left[1 + 2r_0 \exp\left(-t/\tau_{\text{вр}}\right)\right]$$




$$r(t) = r_0 \left(\left(3 \cos^2 \varphi - 1 \right) / 2 \right)$$




$$\frac{dN_2(t)}{N_2(0)} = Ae^{-At} dt$$



Мгновенные спектры люминесценции



Длительные процессы свечения

Фосфоресценция .Внутренняя и
интеркомбинационная конверсия






Процесс




Замедленная люминесценция




- Типа E

Замедленная люминесценция



ЗФ-1, ФОС-2



Применение люминесценции

- Светотехническое применение
 - Люминесцентные лампы
 - электролюминесцентные сигнальные устройства
 - Дневные люминесцентные краски
 - “Светотехническое применение в живой природе”
- Детекторы невидимых излучений
 - Экраны для наблюдения ультрафиолетовых лучей
 - ИК излучение с помощью кристаллофосфоров
 - Рентгеноскопии (сцинтилляторы)

Применение люминесценции

- Кристаллофосфоры в электроннолучевых трубках
- Люминесцентный анализ
 - Обнаружения
 - Качественный
 - Количественный (структурный)
- Биологии
- Судебной экспертизе
- Метод люминесцентного зонда