

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

ЛЕКЦИЯ ДОЦЕНТА АБИЛОВОЙ С.С.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в которых участвуют многие клеточные элементы. Хроническое воспаление обуславливает развитие бронхиальной гиперреактивности, которая приводит к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности в груди и кашля, особенно по ночам или ранним утром.

Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, но изменяющейся обструкцией дыхательных путей в легких, которая часто бывает обратимой спонтанно или под влиянием лечения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

- В МИРЕ **300 МЛН** ЛЮДЕЙ БОЛЕЮТ БА
- Ежегодно умирает **250 000** астматиков


ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ И ПРОЯВЛЕНИЯ БА

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ:

1. Генетическая предрасположенность к атопии
2. Генетическая предрасположенность к бронхиальной гиперреактивности
3. Пол (в детском возрасте БА чаще развивается у мальчиков; в подростковом и взрослом-у женщин)
4. Ожирение

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ:


1. Аллергены
 - 1.1. **Внутридомашние:** клещи домашней пыли, эпидермис домашних животных, аллергены тараканов, грибковые аллергены.
 - 1.2. **Внедомашние:** пыльца растений, грибковые аллергены.
2. Инфекционные агенты (преимущественно вирусные)
3. Профессиональные сенсibilизаторы
4. Курение табака (активное, пассивное)
5. Загрязнение воздуха внутри и снаружи помещений
6. Использование АСПИРИНА
7. Стресс





ПАТОГЕНЕЗ

Патогенез бронхиальной астмы





Fabrice
Laliberté



Fabrice
Lalibert

ЖАЛОБЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НОЧЬЮ, РАННИЕ ПРЕДУТРЕННИЕ ЧАСЫ

ПЕРИОД ПРЕДВЕСТНИКОВ:

- Першение в горле
- Слезотечение, зуд глаз
- Риноррея, чихание

ПЕРИОД РАЗГАРА:

- Приступ удушья
- Экспираторная одышка
- Сухие дистантные хрипы

ПЕРИОД РАЗРЕШЕНИЯ:

- Спонтанно или под действием препаратов приступ заканчивается отхождением вязкой стекловидной мокроты

ЭКВИВАЛЕНТ ПРИСТУПА УДУШЬЯ

- СУХОЙ КАШЕЛЬ, ЧАЩЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ, В РАННИЕ ПРЕДУТРЕННИЕ ЧАСЫ

АНАМНЕЗ

- СЕЗОННОСТЬ
- СОПУТСТВУЮЩИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
(АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ, КОНЬЮНКТИВИТ, ОТЕК КВИНКЕ)
- НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
- СИМПТОМЫ УМЕНЬШАЮТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ.

ОБЪЕКТИВНЫЙ СТАТУС:

ОСМОТР: ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА

- ПОЛОЖЕНИЕ ОРТОПНОЭ – СИДЯ, НАКЛОНИВШИСЬ ВПЕРЕД, С ОПОРОЙ НА КРОВАТЬ, ТУМБУ, ФИКСИРУЮ ВЕРХНИЙ ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС
- БОЛЬНОЙ ИСПУГАН, РЕЧЬ НЕВОЗМОЖНА
- ГРУДНАЯ КЛЕТКА В ПОЛОЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО ВДОХА
- УЧАСТИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ В АКТЕ ДЫХАНИЯ
- ВТЯЖЕНИЕ МЕЖРЕБЕРНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ

ПАЛЬПЦИЯ: ОСЛАБЛЕННОЕ ГОЛОСОВОЕ ДРОЖАНИЕ

ПЕРКУССИЯ: КОРОБОЧНЫЙ ЗВУК, НИЖНИЕ ГРАНИЦЫ ЛЕГКИХ ОПУЩЕНЫ, ПОДВИЖНОСТЬ НИЖНЕГО КРАЯ ОГРАНИЧЕНА

АУСКУЛЬТАЦИЯ: ВЫДОХ УДЛИНЕН, СВИСТЯЩИЕ СУХИЕ ХРИПЫ, УСИЛИВАЮЩИЕСЯ ПРИ ФОРСИРОВАННОМ ДЫХАНИИ

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ НАЛИЧИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ПО КЛИНИЧЕСКИМ ФОРМАМ:

- АТОПИЧЕСКАЯ
- АСПИРИНОВАЯ
- АСТМА ФИЗИЧЕСКОГО УСИЛИЯ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ ПЕРВОМ ОБРАЩЕНИИ ПАЦИЕНТА НА ОСНОВАНИИ СИМПТОМАТИКИ ЗА ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ ДВЕ-ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ (ОФВ1 И ОФВ1/ФЖЕЛ))

| Степень тяжести астмы | Клинические симптомы | Ночные симптомы | Показатели вентиляции (% от должной величины) |
|-------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Легкая интермиттирующая | Кратковременные симптомы реже 1 раза в неделю. Короткие обострения заболевания (от нескольких часов до нескольких дней). Отсутствие симптомов и нормальная функция легких между обострениями | 2 раза в месяц или реже. | МСВ и ОФВ1 > 80%. Вариабельность МСВ < 20% |
| Легкая персистирующая | Симптомы от 1 раза в неделю или чаще, но реже 1 раза в день. Обострения заболевания могут нарушить активность и сон | Чаще 2 раз в месяц, но не еженедельно | МСВ и ОФВ1 > 80%. Вариабельность МСВ 20-30% |

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ (ПРОЛОДЖЕНИЕ)

| Степень тяжести астмы | Клинические симптомы | Ночные симптомы | Показатели вентиляции (% от должной величины) |
|-----------------------|--|---------------------------------|---|
| Средне-тяжелая | Ежедневные симптомы. Обострения нарушают активность и сон. Ежедневный прием β 2-агонистов короткого действия | Возникают более 1 раза в неделю | МСВ и ОФВ1=60-80%. Вариабельность МСВ >30% |
| Тяжелая | Постоянные симптомы. Частые обострения. Физическая работоспособность ограничена. | Частые ночные симптомы. | МСВ и ОФВ1 < 60%. Вариабельность МСВ >30% |

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО УРОВНЮ КОНТРОЛЯ

(УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ ПОСЛЕ НАЧАТОГО ЛЕЧЕНИЯ)

| Признак | Контролируемая | Частично контролируемая | Неконтролируемая |
|--|----------------------|--|------------------------|
| Дневные симптомы | ≤ 2 дней в нед. | > 2 дней в нед | в течение дня |
| Ограничение активности | нет | любое | значительно ограничена |
| Ночные симптомы/ просыпания | ≤ 2 раз в месяц | 1-3 раза в неделю | ≥ 4 раз в неделю |
| Потребность в ингаляционных бронходилататорах (Сальбутамол) | ≤ 2 раз в нед. | > 2 раз в нед. | несколько раз в день |
| Легочные функции (МСВ или ОФВ1) | $\geq 80\%$ | $< 80\%$ от должного или наилучшего результата данного пациента | $< 60\%$ |
| АСТ - тест | ≥ 25 баллов | 20-24 баллов | ≤ 20 баллов |



Узнайте свой результат теста по контролю над астмой

1: В каждом вопросе выберите ответ, который Вам подходит, обведите соответствующую ему цифру и впишите ее в квадратик справа. Постарайтесь честно отвечать на вопросы. Это поможет Вам и Вашему врачу подробно обсудить, как Вы справляетесь с астмой.



Баллы

- Вопрос 1** Как часто за последние 4 недели астма мешала Вам выполнять обычный объем работы в учебном заведении, на работе или дома?
- Все время 1 2 3 4 5
- Очень часто Иногда Редко Никогда
- Вопрос 2** Как часто за последние 4 недели Вы отмечали у себя затрудненное дыхание?
- Чаше чем 1 раз в день 1 2 3 4 5
- 1 раз в день 1 раз в день От 3 до 6 раз в неделю 1 или 2 раза в неделю Ни разу
- Вопрос 3** Как часто за последние 4 недели Вы просыпались ночью или раньше, чем обычно, из-за симптомов астмы (свистящего дыхания, кашля, затрудненного дыхания, чувства стеснения или боли в груди)?
- 4 ночи в неделю или чаще 1 2 3 4 5
- 2-3 ночи в неделю 1 раз в неделю 1 или 2 раза Ни разу
- Вопрос 4** Как часто за последние 4 недели Вы использовали быстродействующий ингалятор (например, Вентолин, Беротек, Беродуал, Атровент, Сальбутамол, Саламол, Сальбен, Астмопент) или небулайзер (аэрозольный аппарат) с лекарством (например, Беротек, Беродуал, Вентолин Небулы)?
- 3 раза в день или чаще 1 2 3 4 5
- 1 или 2 раза в день 2 или 3 раза в неделю 1 раз в неделю или реже Ни разу
- Вопрос 5** Как бы Вы оценили, насколько Вам удавалось контролировать астму за последние 4 недели?
- Совсем не удавалось контролировать 1 2 3 4 5
- Плохо удавалось контролировать В некоторой степени удавалось контролировать Хорошо удавалось контролировать Полностью удавалось контролировать

2: Сложите баллы и запишите полученный результат.

3: Прочитайте на следующей странице, что означает полученный результат.

ИТОГО

ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- 1. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА АТОПИЧЕСКАЯ ФОРМА, СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, ЧАСТИЧНО КОНТРОЛИРУЕМАЯ.
- 2. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА СМЕШАННАЯ ФОРМА (АТОПИЧЕСКАЯ + АСПИРИНОВАЯ), ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ, НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

- **ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ:** ЭОЗИНОФИЛИЯ
- **ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОКРОТЫ:** ЭОЗИНОФИЛЫ, КРИСТАЛЛЫ ШАРКО-ЛЕЙДЕНА (БЛЕСТЯЩИЕ КРИСТАЛЛЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ИЗ РАЗРУШЕННЫХ ЭОЗИНОФИЛОВ), СПИРАЛИ КУРШМАНА (СЛЕПКИ БРОНХОВ)
- **IG E** – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

Определение газов крови (по возможности) –

при наличии признаков дыхательной недостаточности

Показания: - $MCV < 50\%$; - отсутствие ответа на терапию; - $SaO_2 \leq 92\%$.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ



- **Спирометрия** - позволяет подтвердить диагноз при выявлении обструкции дыхательных путей (**снижение показателя $ОФВ_1 < 80\%$ и соотношения $ОФВ_1/ФЖЕЛ <$**).

Примечание: нормальные показатели спирометрии не исключают диагноза бронхиальной астмы

- **Бронходилатационная проба** - подтверждает обратимость бронхиальной обструкции - **прирост $ОФВ_1 > 12\%$ (+200 мл) или $МСВ > 20\%$ (+60 л/мин) через 10–15 мин после ингаляции 200–400 мкг сальбутамола.**


Примечание: отрицательный результат БДП не исключает диагноза бронхиальной астмы.

- **Бронхопровокационная проба** (для определения гиперреактивности бронхов) – **снижение $ОФВ_1 > 20\%$ на стандартную дозу метахолина или гистамина** (*проводится только в условиях специализированного стационара при исходном показателе $ОФВ_1 \geq 80\%$, вне обострения*). *Примечание:* отрицательный результат исключает наличие БА, а положительный результат не всегда подтверждает БА.

Спирометрия

Кривая объем - время

Рис. 1-б. Типичные спирометрические показатели здорового человека, больного астмой и больного с астмой после приема бронходилататора (БД)



Примечание: каждое значение - наилучшее из трех попыток.

Печатается с разрешения *Dr. Stephen T. Holgate*.



- **Суточное мониторирование МСВ** с определением variability в домашних условиях (индивидуальным прибором). **в течение 2 – 4 недель**. Характерными являются «**симптом утреннего провала**» и **variability МСВ >20%**.

Оценка тяжести астмы

(принцип зональной оценки)



зеленая зона,МСВ от 100 до 80%;




желтая зона,МСВ от 80 до 60%;




красная зона,МСВ менее 60%


Неконтролируемая
астма



“Утренние провалы”



Астма под
контролем



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПО ПОКАЗАНИЯМ

- **Рентгенография грудной клетки** – для исключения другой патологии со стороны органов дыхания или выявления осложнений БА.
- **Кожные аллергологические тесты (prick-test)** – с целью уточнения аллергологического статуса.
- **Пульсоксиметрия** (у пациентов с признаками тяжелого обострения заболевания)

ЛЕЧЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ АСТМЫ - ЭТО ДЛИТЕЛЬНЫЙ, ЧАСТО ПОЖИЗНЕННЫЙ ПРОЦЕСС, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ БОЛЕЗНИ.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ:

1. ОБУЧЕНИЕ БОЛЬНОГО.
2. ОЦЕНКУ И МОНИТОРИРОВАНИЕ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ АСТМЫ С ПОМОЩЬЮ ПИКФЛОУМЕТРИИ.
3. КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРНЫХ ФАКТОРОВ, ИСКЛЮЧЕНИЕ (ЭЛИМИНАЦИЮ) ПРОВОЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ.
4. ПОДБОР ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЯ БАЗИСНЫЕ (ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ) И СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ (БРОНХОЛИТИЧЕСКИЕ) ПРЕПАРАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

| Препарат | Суточная доза |
|--|------------------|
| B2-агонист короткого действия | |
| Сальбутамол (HFA) | 200мкг 4 раза |
| B2-агонисты пролонгированного действия | |
| Сальметерол (HFA) | 50 мкг 2 раза |
| Формотерол (DPI) | 12 мкг 2 раза |
| Формотерол (HFA) | 12 мкг 2 раза |
| M-холинолитик короткого действия | |
| Ипратропия бромид | 40мкг 4 раза |
| M-холинолитик пролонгированного действия | |
| Тиотропия бромид | 18мкг 1 раз |
| Метилксантин пролонгированного действия | |
| Теофиллин | 200-300мг 2 раза |

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

| Препарат | Суточная доза |
|-------------------------------|---|
| Ингаляционные кортикостероиды | |
| Беклометазон (HFA) | низкая 100–200 мкг, средняя 200–400 мкг, высокая >400 мкг |
| Будесонид (DPI) | низкая 200–400 мкг, средняя 400–800 мкг, высокая >800 мкг |
| Флутиказон (HFA) | низкая 100–250 мкг, средняя 250–500 мкг, высокая >500 мкг |
| Комбинированные препараты | |
| Флутиказон/сальметерол (HFA) | 50–250/25 мкг 2 раза |
| Будесонид/формотерол (DPI) | 80–160–320–400/4.5–9–12 мкг 2 раза |
| Системные кортикостероиды | |
| Преднизолон (табл.) | 20-30мг/сутки |
| Модификаторы лейкотриенов | |
| Монтелукаст | 10 мг 1 раз вечером |
| Зафирлукаст | 20 мг 2 раза |

Ступенчатая поддерживающая терапия бронхиальной астмы

| Ступени | Препараты 1-ой линии | Альтернативная терапия |
|------------------|---|--|
| 1 ступень | Низкая доза ИКС /формотерол <i>по мере необходимости</i> | Низкая доза ИКС + β_2 - агонист короткого действия |
| 2 ступень | <i>Ежедневные</i> низкие дозы ИКС <i>или</i> низкая доза ИКС / формотерол <i>по мере необходимости</i> | ИЛР или низкая доза ИКС + β_2 - агонист короткого действия |
| 3 ступень | Низкая доза ИКС / ДДБА | Средняя доза ИКС <i>или</i> низкая доза ИКС + ИЛР |
| 4 ступень | Средняя доза ИКС / ДДБА | Высокая доза ИКС + Тиотропий или ИЛР |
| 5 ступень | Высокая доза ИКС / ДДБА <i>Дополнительные варианты:</i> <i>Анти-IgE препараты.</i> | Если эффект не достигается на ступени 4 добавить: пероральные кортикостероиды низкие дозы ежедневно (Преднизолон 2,5-5 мг/сут.) |

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЛЕЧЕНИЯ, КОГДА АСТМА ПОД КОНТРОЛЕМ (СТУПЕНЬ ВНИЗ)

- ПРИ КОНТРОЛЕ С ПОМОЩЬЮ ИНГАЛЯЦИЙ СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ДОЗ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ: 50%-Е СНИЖЕНИЕ ДОЗЫ С 3-МЕСЯЧНЫМИ ИНТЕРВАЛАМИ.
- ПРИ КОНТРОЛЕ С ПОМОЩЬЮ ИНГАЛЯЦИЙ НИЗКИХ ДОЗ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ: СОКРАТИТЬ ПРИЕМ ЛЕКАРСТВА ДО ОДНОГО РАЗА В ДЕНЬ
- ПРИ КОНТРОЛЕ С ПОМОЩЬЮ СОЧЕТАНИЯ ИНГАЛЯЦИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ И В2-АГОНИСТА ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, УМЕНЬШИТЬ ДОЗУ ИНГАЛЯЦИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ НА 50% И ПРОДОЛЖАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ В2-АГОНИСТА ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
- ЕСЛИ КОНТРОЛЬ УДАЕТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ, УМЕНЬШИТЬ ДОЗУ ИНГАЛЯЦИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ДО МАЛОЙ И ПРЕКРАТИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ В2-АГОНИСТА ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

СТУПЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ ВВЕРХ ПРИ ПОТЕРЕ КОНТРОЛЯ АСТМЫ

- ПОТРЕБНОСТЬ В ПОВТОРНЫХ ИНГАЛЯЦИЯХ В2-АГОНИСТОВ В ТЕЧЕНИЕ 1-2 ДНЕЙ И БОЛЕЕ УКАЗЫВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТЬ В ПЕРЕСМОТРЕ И УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ.

Лечение обострения бронхиальной астмы в условиях лечебного учреждения первичного звена



1. Бронхолитическая терапия:

Сальбутамол (дозированный ингалятор)

через спейсер 4-8 вдохов каждые 20 мин первый час, далее – до 10 вдохов каждые 1-2ч.

или



Сальбутамол через небулайзер (в сочетании с физ. раствором): 2,5–5 мг каждые 20 мин 3 дозы, затем 2,5–10 мг через 1–4 ч по необходимости или 10–15 мг/ч постоянно.

или

Ипратропия бромид 2 мл через небулайзер

(в сочетании с физ. раствором) повторять каждые 20 минут 3 раза в течение 1 часа

2. Если у пациента не наступает облегчения через 10-20 минут после начала приема Сальбутамола, или если у больного тяжелый приступ астмы, то следует добавить:

Преднизолон 50-60 мг внутривенно струйно медленно на физиологическом растворе

или

если больной может глотать - ***Преднизолон 30-60 мг в таблетках внутрь*** или другой глюкокортикостероид в эквивалентной дозе (и далее коротким курсом 30-60 мг/день внутрь в течение 5-7 дней с последующей полной одномоментной отменой)

3. Кислород (по доступности)- до достижения $SaO_2=93-95\%$.

После купирования острых астматических приступов, снижения суточной потребности в сальбутамоле и увеличения скорости выдоха:

- назначается базисная терапия ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС), если она не проводилась ранее;
- если обострение бронхиальной астмы наступило на фоне базисной терапии ИГКС, то суточная доза ИГКС увеличивается в 1,5 раза от исходной

•Спасибо за внимание!