

Красная книга Самарской области

Выполнила: Спирина Елизавета
С-105
Тольяттинский медицинский
колледж
Руководитель: Загуменнова Е.М.

Пугелька степная



Редкая перелётная птица из отряда соколообразные. В России признается видом, находящимся под угрозой исчезновения. Имеет широкий евразийско-африканский ареал. Основные местообитания в России расположены в степной зоне. В Самарской области этот вид встречается на открытых степных участках с густым травостоем в Большечерниговском районе (близ урочища Грызлы).

Балобан



Эпизодически гнездящаяся в Самарской области кочующая или перелётная птица из отряда соколообразные. Имеет пятнистый евроазиатский гнездовой ареал, приуроченный к лесостепной зоне, южной окраине лесной зоны островным лесам в степях. Численность вида в России сокращается. Гнездовья балобана располагаются в островных лесах, лесополосах, по опушкам лесных массивов вблизи открытых пространств. В Самарской области этот крупный сокол отмечается в Заволжье (Большечерниговский, Борский и Волжский районы).

Дрофа



Редкая степная птица из отряда журавлеобразные. Европейский подви́д дрофы имеет очаговый евроазиатский ареал. Населяет злаковые степи. Гнездится на сельскохозяйственных угодьях (посевы зерновых культур, пастбища). Встречается на самом юге Самарской области в Сыртовом Заволжье (Большечерниговский район)

Аист чёрный



Редкая птица из отряда аистообразные. Вид имеет широкий евроазиатско африканский ареал, но внутри него распространение спорадическое. Основные местообитания в России - В старые леса вблизи рек, стариц, лесных болот и озер. В Самарской области до 90-х гг. XX века гнезился в глухих лесных урочищах Жигулёвской возвышенности.

Черепаша болотная



Вид широко представлен на территории России от Смоленской области по границе с Белоруссией и Украиной на юг, в верховьях и нижнем течении Дона, на средней Волге, левобережье реки Урал, в Прикаспийской низменности, на Кавказе. За пределами России болотная черепаха распространена в Белоруссии, Литве, Украине, в Южной и Центральной Европе, Передней Азии, Северо-западной Африке. В Самарской области болотная черепаха обитает на территории национального парка "Самарская Лука", в Ставропольском районе нашей области.

Гадюка Никольского



Малоизученное и неопределенное по статусу животное из отряда змеи. Имеет европейский ареал. Населяет лесостепную и степную зону Европейской России. В летний период змеи встречаются на полянах, опушках и просеках в изолированных участках широколиственных лесов. В Самарской области относительно многочисленный вид (или подви́д). Обитает в Предволжье (Ставропольский район, Жигулёвский государственный заповедник).

Белорыбица



Ставшая очень редкой в водоемах Самарской области рыба из отряда лососеобразные. Каспийско-Уральский подвид белорыбицы находится в России под угрозой исчезновения. Прежде была широко распространена в бассейнах Волги и Урала. В результате постройки каскада гидроэлектростанций в бассейне Волги почти исчезла. В 70-80-е гг. XX в. единичные особи встречались в р. Сок и низовьях р. Уса. Ныне отмечается лишь в южной части Саратовского водохранилища (акватория около с. Приволжье

Кумжа



Рыба из отряда лососеобразные. Живет в ручьях и малых реках с быстрым течением, хо лодной водой, песчаным и галечным дном (бассейны рек Волги и Урала). Встречается на северо востоке Самар-ской области (Камыш-линский район, бассейн р. Байтуган; Клявлинский район, бассейн р. Шешма).

Выхухоль русская



Крайне редкое животное из отряда насекомоядные. Сокращающийся в численности реликтовый вид Европейск Современный ареал вида имеет разорванный характер. Встречается в реках с тихим течением, пойменных озёрах- старицах и затонах с богатой водно болотной и прибрежной растительностью (Борский район, долина р. Самары; Большечерниговский район, старицы р. Большой Иргиз). Эндемик средней полосы России

Спасибо за внимание !