

# Алгебра

Кабанов Александр Николаевич  
к.ф.-м.н., доцент кафедры кибернетики

## 2. Системы линейных уравнений

# Понятие СЛУ

- Система  $m$  линейных уравнений с  $n$  переменными имеет вид:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

- В кратком виде такую систему записывают  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j, i = 1, \dots, m.$

# Виды СЛУ

- СЛУ называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение. Если решений нет, то несовместной.
- Совместная СЛУ называется определенной, если она имеет единственное решение, и неопределенной, если решений более одного.
- Две СЛУ называются равносильными, если они имеют одно и то же множество решений.
- Если все правые части в СЛУ равны 0, то система называется однородной. Иначе – неоднородной.

# СЛУ в матричной форме

- Матрицей системы называется матрица коэффициентов при переменных:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

# СЛУ в матричной форме

- Матрица-столбец неизвестных  $X =$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

- Матрица-столбец свободных членов (правых частей)  $B =$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

- Тогда СЛУ можно записать в виде:  $AX = B$ .

# Метод обратной матрицы

- Пусть в СЛУ  $AX = B$  матрица  $A$  квадратная и невырожденная. Тогда для матрицы  $A$  существует обратная матрица  $A^{-1}$ .
- Умножим слева обе части матричного уравнения на  $A^{-1}$ . Получим:  $A^{-1}AX = A^{-1}B$ .
- Отсюда:  $X = A^{-1}B$ .

# Метод расширенной матрицы

- Составим расширенную матрицу системы  $(A|B)$ . Элементарными преобразованиями строк расширенной матрицы приведем матрицу  $A$  к единичной. Тогда матрица  $B$  обратится в  $A^{-1}B$ .
- Расширенная матрица примет вид  $(E|A^{-1}B)$ .
- После чего можем использовать  $X = A^{-1}B$ .



# Метод Крамера

- **Теорема Крамера:** Пусть матрица СЛУ квадратная и невырожденная. Пусть  $|A_i|$  – определитель матрицы, получаемой из матрицы  $A$  заменой  $i$ -го столбца столбцом свободных членов  $B$ . Тогда система имеет единственное решение:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, i = 1, \dots, n.$$

# Элементарные преобразования в СЛУ

- **Теорема (о равносильности СЛУ):** При любых элементарных преобразованиях строк расширенной матрицы СЛУ (кроме транспонирования) получаются равносильные СЛУ.
- На этой идее основан метод Гаусса, заключающийся в последовательном исключении неизвестных с помощью элементарных преобразований.

# Метод Гаусса

- Построим для СЛУ расширенную матрицу.
- С помощью элементарных преобразований приведем расширенную матрицу к ступенчатому виду.
- Если в матрице  $A$  образовалась нулевая строка при том, что в столбце правых частей в этой строке не ноль, то СЛУ несовместна.
- Если матрица  $A$  привелась к треугольному виду, то СЛУ имеет единственное решение.
- Если в ступенчатой матрице число неизвестных больше числа уравнений, то СЛУ имеет бесконечное множество решений.

# Совместность СЛУ

- **Теорема Кронекера-Капелли (о совместности СЛУ):** СЛУ совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы этой системы.

# Базисные переменные

- Пусть ранг  $r$  расширенной матрицы СЛУ меньше числа переменных. В этом случае СЛУ имеет бесконечное множество решений.
- Выберем  $r$  переменных и составим матрицу системы из коэффициентов только при этих переменных.
- Данная матрица будет квадратной или может быть приведена к квадратной элементарными преобразованиями.

# Базисные решения

- Если эта матрица невырождена, то выбранные переменные называются основными или базисными.
- Оставшиеся переменные называются неосновными или свободными.
- Решение СЛУ, в котором все свободные переменные полагаются равными нулю, называется базисным.
- **Замечание:** Выбор базисных переменных неоднозначен.

# Однородные СЛУ

- Однородная СЛУ всегда совместна (как минимум, имеется нулевое решение).
- Для существования ненулевых решений ранг матрицы системы должен быть меньше числа переменных.
- Если  $e$  – решение однородной СЛУ, то и  $\lambda e$  тоже будет решением.
- Если  $e_1$  и  $e_2$  – решения однородной СЛУ, то и  $e_1 + e_2$  тоже будет решением.

# Фундаментальные решения

- Совокупность линейно независимых решений однородной СЛУ называется фундаментальной, если любое возможное решение этой СЛУ является линейной комбинацией этих решений.
- **Теорема ( о фундаментальных решениях однородной системы):** Если ранг  $r$  матрицы СЛУ меньше числа переменных  $n$ , то:
  1. Существует совокупность линейно независимых решений СЛУ.
  2. Число линейно независимых решений равно  $n - r$ .
  3. Любое решение СЛУ можно представить в виде линейной комбинации фундаментального набора решений



# Фундаментальные решения

- Любая однородная СЛУ, имеющая ненулевые решения, имеет фундаментальный набор решений (ФНР).
- Если расширенная матрица системы не имеет иррациональностей, то всегда можно построить ФНР с целыми числами.