РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА

Институт дефектологического образования и реабилитации

Изменение внутреннего состояния здоровых людей после испытания н себе проблем с нарушением речи

> Табачкова Евгения Алексан<mark>дровна,</mark> 1 курс <mark>1 группа</mark> Тел. 89<mark>643786456</mark>

E-mail: tabachkova.oksana@yandex.ru

Многие люди испытывают негатив и скрытую агрессию при общении с заикающимся человеком, не понимая, что испытывает человек с нарушением речи. Целью моей работы является:

odopobbix modori k modrini o mapy monitroni po mi

выяснить, как изменяется

внутренне

состояние здоровых людей



испытания на себе проблем с нарушением речиДля исследования были привлечены 23 студента в возрасте от 17 до 22 лет.



<u> 7 Проведение фоновых тестов:</u>

- 1. Шкала оценки субъективной комфортности, разработанная А.Б. Леоновой.
- 2. Методика «Оценка нервно-психического напряжения», предложенная Т.А. Немчиным.
 - 3. Тест Бурдона.
- 4. 100-бальная шкала оценки отношения к людям с заиканием.
- *II* Испытание проблемы заикания на себе. (Произношение звука [т] в течение *2,5* мин).

Результаты проведенных тестов представлены в таблицах *1, 2.*

аблица *1 (*резул<u>ьтаты до проведения эксперимента)</u>

NΩ	Возраст	До	Шкала комфортности	Эмоциональное состояние	Бурдон	Шкала отношения к заикающимся в %
	17 лет	0.00			3	
1			34	45	5/9	90
2			36	51	20/14	75
3		3	32	55	2/10	99
4		3000	28	50	7/14	60
5			33	41	6/15	95
6		ì	61	46	0/11	100
7		9	41	39	2/11	80
8		0.000	42	54	18/14	90
	18 лет			svere .	Andrew Commercial Comm	essen
9			56	42	10/15	63
10		8	51	54	4/14	75
11		000	26	66	2/9	96
12			45	45	3/14	60
13		. 3	41	68	4/10	95
14		-	63	51	7/11	95
15		0.00	46	53	5/10	50
16			57	48	3/10	100
17		. 8	56	50	6/15	30
	Старше 18 лет	***				
18		8	44	35	12/12	100
19	1	6 8	32	55	3/12	50
20		0.00	37	51	6/11	70
21			41	43	13/10	75
22		8	29	64	5/10	100
23		6 8	49	46	15/13	90
Среднее значение		43	43	7/12	80	

Таблица *2 (*результаты после проведенного эксперимента)

После	Шкала комфортности	Эмоциональное состояние	Бурдон	Шкала отношения к заикающимся в %
	41	43	0/8	90
	35	61	10/15	80
	25	43	0/11	100
	28	55	12/14	63
	41	36	15/14	92
	53	51	1/14	100
	35	37	6/12	95
	50	42	15/12	90
	51	34	4/15	70
	32	53	3/11	77
	37	73	4/10	96
	44	33	3/11	75
	34	38	5/11	95
	62	47	0/10	100
	47	33	6/9	65
	36	51	5/11	100
	51	44	7/18	74
	54	35	14/13	100
	31	46	1/11	50
	42	40	4/12	65
	28	34	2/11	80
	30	Даж тивация	301/indow	100
	45	37	10/15	94
Среднее значение	40		15/12 atb vviii	188vs, переидип

произошли некоторые и<mark>зменения. А именно:</mark> изменилось состояние комфортности. На тестах проведенных до эксперимента (произношения звука [т]) наблюдался средний уровень субъективного комфорта, пониженное самочувствие, после эксперимента (испытания на себе проблемы заикания) уровень субъективного комфорта стал низким, стало низкое самочувствие. Следовательно, мы можем сделать вывод, что состояние комфортности понизилось.

VIS TIPVIDED CITIDIA PATICE LACTIVILI WIDI BVIDVINI, 910

Изменилось состояние нервно-психического напряжения: до эксперимента было умеренное, или интенсивное нервно-психическое напряжение, после проведение эксперимента стало слабое, или детенсивное нервно-психическое напряжение.

Тест Бурдона показывает, что у испытуемых увеличилась концентрация внимания.

А также изменилось отношение к людям с заиканием:

в среднем увеличился процент терпимости к


данным нарушением речи (до

эксперимента

COORTINIA DOSVIDITAT COCTABRICE PO 0/

Тосле проведенных тестов и эксперимента, можно подвести следующий итог : после испытания на себе проблем с заиканием наблюдается изменение внутреннего состояние всех испытуемых. Во-первых, ухудшается нервно-психическое состояние, во-вторых, заметно понижается состояние комфортности. Но при этом повышается концентрация внимания и улучшается отношение к людям с нарушением речи, в частности с заиканием.

На основе всего выше сказанного, можно сделать следующий вывод: мне удалось выяснить, как изменяется внутренне состояние здоровых людей, после испытания на себе проблем с нарушением речи-заиканием. Стало понятно, как влияет проблема заикание на психикоэмоциональное состояние, а также удалось проследить, как через осознание трудностей заикания изменяется отношение к людям с данным нарушением. исследования: в ходе эксперимента было доказано, что именно после эмоционального напряжения у испытуемых изменяется отношение к заикающимся людям, оно становится более терпимым. Следовательно, мы можем сказать, что в большинстве случаев только поставив себя на место



человека с нарушением речи, здоровые люди смогут адекватно оценить своё отношение к ним.



Табачкова Е.А. Тел. 89643786456

E-mail: tabachkova.oksana@yandex.ru