


Семья, затронутая ВИЧ-инфекцией



**Выполнила: Исмагилова Г.Д, студентка гр.
зПСРм-15-1**

**Проверила: Потрикеева О. Л, канд. пед. наук,
доцент кафедры социальной работы
Магистерского-педагогических дисциплин
2017.**

- **ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ** представляет собой болезнь, вызываемую вирусом иммунодефицита человека (**ВИЧ**), хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (**СПИД**), приводящего ВИЧ-инфицированного к быстрой гибели. Преимущественное распространение ВИЧ среди молодого населения приводит к:
 - **повышению смертности,**
 - **сокращению рождаемости,**
 - **уменьшению продолжительности жизни населения,**
 - **Сокращению численности работающего населения**
 - **увеличению затрат на здравоохранение – многофакторное деструктивное воздействие на социальную и экономическую жизнь общества.**

Общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных россиян составило к 31 декабря 2013 г. 798120 человек, что составляет 0,5% от всего населения, а среди возрастной группы 15-49 лет - 0,8% населения. По данным Роспотребнадзора, согласно форме мониторинга приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Российской Федерации к 31 декабря 2013 г. умерло по разным причинам 140000 ВИЧ-инфицированных, в том числе 20511 только за 2012 год. Случаи ВИЧ обнаруживались во всех регионах России, преимущественно среди городского населения.

- **Семья, затронутая ВИЧ-инфекцией (семья, затронутая ВИЧ)** - семья, в которой один или более членов имеют диагноз ВИЧ-инфекции и в этой связи семья в целом и каждый ее член, независимо от наличия у него диагноза, в той или иной степени сталкиваются с психологическими, социальными, медицинскими, юридическими проблемами, обусловленными заболеванием.

Наиболее нуждающимися в социальном обслуживании являются следующие категории ЛЖВ:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- **дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на воспитании в семьях;**
- дети с неопределенным вич-статусом;
- **подростки;**
- беременные женщины;
- лица, освобожденные из учреждений пенитенциарной системы;
- **наркозависимые;**
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- **женщины с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.**

Социально-психологические проблемы семей, затронутых ВИЧ-инфекцией

- **Первый период:** Установление ВИЧ-положительного статуса
- **Второй период:** Появление клинических признаков заболевания
- **Третий период:** терминальная стадия ВИЧ инфекции
- Потеря социального статуса
- Стресс, чувство одиночества
- «Изоляция» себя и своего ребенка, отказ от ребенка
- Проблемы с устройством ребенка в ДОУ, в школу, перевод в другое учреждение
- Трудности с трудоустройством матери, отца
- Ухудшение материального положения семьи, увольнение с работы
- Опасение за физическое и психическое здоровье ребенка
- Нарушения во взаимоотношениях с родственниками, развод
- Стигматизация и дискриминация и т.д.

Технология социальной работы

- I этап. Получение предварительной информации о клиенте и его семье, сбор дополнительных сведений (изучение и сбор дополнительных сведений).
- II этап. Установление контакта с ВИЧ-положительным (и членами его семьи) — по согласию.
- III этап. Определение задач в рамках социального сопровождения и составление индивидуального плана социально-психологической реабилитации.
- IV этап. Реабилитация клиентов (при наличии согласия).
- V этап. Патронат ВИЧ-положительного и его семьи (при наличии согласия).

ОПЫТ США:

- **МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ**
- **СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- **УСЛУГИ НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (МАССАЖ, ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ)**
- **ПРОГРАММУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ**
- **КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ**
- **ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ**
- **ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ**
- **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТАМИ**



Инновационные технологии

- **ВААРТ** (от английского **HAART**) — еще один используемый термин: **высокоактивная антиретровирусная терапия**, предполагающая одновременное применение комбинации из трех и более антиретровирусных лекарств и являющаяся стандартным методом лечения ВИЧ-инфекции.

