Семья, затронутая ВИЧ-инфекцией

Выполнила: Исмагилова Г.Д, студентка гр. зПСРм-15-1

Проверила: Потрикеева О. Л, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы и психолого-педагогических дисциплин

Магнитогорск, 2017.

- **ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ** представляет собой болезнь, вызываемую вирусом иммунодефицита человека **(ВИЧ),** хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита **(СПИД),** приводящего ВИЧ-инфицированного к быстрой гибели. Преимущественное распространение ВИЧ среди молодого населения приводит к:
- **повышению смертности,**
- **сокращению рождаемости,**
- **уменьшению продолжительности жизни населения,**
- **Сокращению численности работающего населения**
- **увеличению затрат на здравоохранение – многофакторное деструктивное воздействие на социальную и экономическую жизнь общества.**

Общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных россиян составило к 31 декабря 2013 г. 798120 человек, что составляет 0,5% от всего населения, а среди возрастной группы 15-49 лет - 0,8% населения. По данным Роспотребнадзора, согласно форме мониторинга приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Российской Федерации к 31 декабря 2013 г. умерло по разным причинам 140000 ВИЧ-инфицированных, в том числе 20511 только за 2012 год. Случаи ВИЧ обнаруживались во всех регионах России, преимущественно среди городского населения.

- **Семья, затронутая ВИЧ-инфекцией (семья, затронутая ВИЧ)** - семья, в которой один или более членов имеют диагноз ВИЧ-инфекции и в этой связи семья в целом и каждый ее член, независимо от наличия у него диагноза, в той или иной степени сталкиваются с психологическими, социальными, медицинскими, юридическими проблемами, обусловленными заболеванием.

Наиболее нуждающимися в социальном обслуживании являются следующие категории ЛЖВ:

- **дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;**
- **дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на воспитании в семьях;**
- **дети с неопределенным вич-статусом;**
- **подростки;**
- **беременные женщины;**
- **лица, освободившиеся из учреждений пенитенциарной системы;**
- **наркозависимые;**
- **лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;**
- **женщины с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.**

Социально-психологические проблемы семей, затронутых ВИЧ-инфекцией

- **Первый период:** Установление ВИЧ-положительного статуса
- **Второй период:** Появление клинических признаков заболевания
- **Третий период:** терминальная стадия ВИЧ инфекции
- Потеря социального статуса
- Стресс, чувство одиночества
- «Изоляция» себя и своего ребенка, отказ от ребенка
- Проблемы с устройством ребенка в ДОУ, в школу, перевод в другое учреждение
- Трудности с трудоустройством матери, отца
- Ухудшение материального положения семьи, увольнение с работы
- Опасение за физическое и психическое здоровье ребенка
- Нарушения во взаимоотношениях с родственниками, развод
- Стигматизация и дискриминация и т.д.

Технология социальной работы

- I этап. Получение предварительной информации о клиенте и его семье, сбор дополнительных сведений (изучение и сбор дополнительных сведений).
- II этап. Установление контакта с ВИЧ-положительным (и членами его семьи) — по согласию.
- III этап. Определение задач в рамках социального сопровождения и составление индивидуального плана социально-психологической реабилитации.
- IV этап. Реабилитация клиентов (при наличии согласия).
- V этап. Патронат ВИЧ-положительного и его семьи (при наличии согласия).

ОПЫТ США:

- МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- УСЛУГИ НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (МАССАЖ, ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
- ПРОГРАММУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ
- ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОСОБИЙ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТАМ

Инновационные технологии

- **ВААРТ** (от английского **HAART**) — еще один используемый термин: **высокоактивная антиретровирусная терапия**, предполагающая одновременное применение комбинации из трех и более антиретровирусных лекарств и являющаяся стандартным методом лечения ВИЧ-инфекции.