

Сестринский процесс при сахарном диабете

Выполнила: Коротаяева А.С.

Сахарный диабет

Сахарный диабет - это группа метаболических (обменных) заболеваний, характеризующихся гипергликемией, которая является результатом дефектов секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов.

Выделяют два типа сахарного диабета:

- инсулинозависимый (диабет I типа) ИНЗСД;
- инсулиннезависимый (диабет II типа) ИЗСД

Сахарный диабет I типа чаще развивается у молодых людей, а II типа - у

ЭТИОЛОГИЯ

Сахарный диабет чаще возникает вследствие относительной инсулиновой недостаточности, реже - абсолютной.

Главной причиной развития инсулинзависимого сахарного диабета является органическое или функциональное поражение β -клеток островкового аппарата поджелудочной железы, что приводит к недостаточности синтеза инсулина. Эта недостаточность может возникнуть после резекции поджелудочной железы, что, при склерозе сосудов и вирусном поражении поджелудочной железы, панкреатите, после психических травм, при употреблении продуктов, содержащих токсические вещества, непосредственно поражающие β -клетки и пр.

Диабет II типа - инсулиннезависимый - может быть вызван изменением функции других эндокринных желез, вырабатывающих гормоны, обладающие контринсулярным свойством. К этой группе относятся гормоны коры надпочечников, щитовидной железы, гипофизарные гормоны,

Этиология

Этиология

Этиология

Этиология

Этиология

Этиология

Этиология

Этиология

Этиология

Этиология

Этиология

Этиология