

Нарушения сознания

Кировский ГМУ
Кафедра психиатрии им.
профессора В.И. Багаева

Сознание

- **Сознание** - способность отражать окружающую действительность, воздействовать на нее и способность отдавать себе отчет (*Случевский*)

Нарушения сознания (критерии К. Ясперс)

- ***отрешенность от реального внешнего мира*** - отрывочное, фрагментарное, неотчетливое восприятие действительности
- ***нарушение ориентировки*** во времени, месте, в собственной личности
- ***нарушение стройности мышления***
- ***амнезия***
- ***нарушения целенаправленных действий***

Выключение сознания

Оглушение – легкая степень выключения сознания

- заторможенность, безучастность, сонливость, истощаемость
- повышен порог восприятия (гипоэстезия)
- Снижение ориентировки в месте и времени
- Брадипсихия, гипомнезия, снижение концентрации и объема внимания
- Фрагментарная амнезия периода нарушенного сознания

Обнубиляция

Сомноленция

Сопор

- глубокое угнетение сознания
- Не реагируют на речь
- Болевая чувствительность
- Реакция зрачков на свет
- Безусловные рефлексy (сухожильные, брюшные, корнеальный и конъюнктивальный)
- Нет контроля над сфинктерами

Кома

- тяжелая степень выключения сознания
- Арефлексия на раздражители
- Отсутствуют безусловные рефлексы
- Патологические рефлексы

Синдромы выключения сознания

Синдром	Словесный контакт	Болевая чувствительность	Рефлексы безусловные
Оглушенность	+	+	+
Сопор	-	+	+
Кома	-	-	-

Формы помрачения сознания

- **делирий**
- **онейроид**
- **аменция**
- **сумеречное расстройство сознания**

Делирий

- острый психоз с помрачением сознания,
- иллюзии
- сценopodobные истинные галлюцинациями устрашающего (зоологического) характера,
- нарушение ориентировки в месте и времени (при сохраненной оценке собственной личности)
- резкое психомоторное возбуждение

Стадии делирия:

- 1) гиперестезическая – с повышенной чувствительностью к раздражителям;
- 2) иллюзорная – парейдолическая, с фантастическими образами в узорах обоев;
- 3) галлюцинаторная – с зрительными, зоопическими галлюцинациями

Виды делирия

- **Профессиональный делирий** - убежденность больного в том, что он находится у себя на работе, совершает движения, соответствующие с его профессией («копает землю», «укладывает кирпичи», «подметает», «подписывает бумаги»).
- **Мусситирующем (бормочущем) делирии** пациент недоступен контакту, речь непонятная, бормочущая, перебирание одежды, одеяла и простыни.

Причины делирия: интоксикации, инфекции, ЧМТ, органические заболевания ГМ

Онейроид

- наплыв непроизвольных фантастических сноподобно-бредовых псевдогаллюцинаций
- дезориентировка в окружающем и в себе
- двойная ложная ориентировка
- Разорванность мышления
- кататонические расстройства

Причины: шизофрения, эпилепсия, ЧМТ

Аменция

- грубое помрачение сознания
- бессвязное мышление,
- недоступность для контакта,
- отрывочные обманы восприятия
- физическое истощение
- растерянность, аффект недоумения
- невозможность воспринимать события
- грубая дезориентировка
- инкогерениция мышления
- хаотичное возбуждение в пределах постели
- Причины: тяжелые затяжные соматические заболевания

Сумеречное расстройство сознания

- внезапное начало и резкое прекращение
- короткая продолжительность (от десятков минут до нескольких часов)
- фрагментарное восприятие окружающего
- отсутствие контроля за своими действиями
- контакт затруднен
- тотальная амнезия

Причины: эпилепсия, ЧМТ, органические заболевания ГМ

Варианты сумеречного расстройства

Бредовый и галлюцинаторный варианты

- резкое психомоторное возбуждение,
- brutальная агрессия,
- злобный аффект
- неконтролируемые (жестокие, нелепые, необъяснимые) действия - опасность для окружающих

Психомоторные приступы


(амбулаторные автоматизмы)

-простые автоматизированные действия
(переставляют предметы, одеваются, идут по улице)

Фуги - кратковременные эпизоды 1-2 мин
(срываются с места, бегут, сбрасывают с себя одежду, вращаются на месте)

Трансы - более продолжительные эпизоды
(бессмысленное блуждание)

Сомнамбулизм (снохождение)



Благодарю за внимание!