

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Песков Богдан (3-Б класс)

Светлая бабочка.

Покрыта тонкими волосками, на груди и брюшке. У неё 6 ножек, 3 пары острых коготка. Челюсти развиты, хоботок, скрученный спиралью. Питается нектаром, хоботок длинный, его строение сложное. Усики, как антенна, они развиты и обоняние развиты

на цветках, никакого вреда нашей культуре – бедствие для

для гусениц капустницы, помимо этого являются редис, хрен, рапс,



Морфо



Дневные бабочки семейства Нимфалиды. Существует свыше 70 видов.

Размах крыльев от 50 до 210 мм. Окраска в основном, синяя, голубая с металлическим блеском. Продолжительность ежедневной активности не превышает 2 часов. Куколка зеленого цвета, подражает плодам деревьев. Ареал обитания Центральная и Южная Америка, Бразилия.

СТРОЕНИЕ БАБОЧКИ

Тело состоит из трех частей: головы, груди и брюшка.

На голове расположены хоботок, глаза. У различных видов окраска глаз варьирует от черного до оранжевого, иногда же темно-коричневого. При приеме пищи бабочка вытягивает длинный хоботок, погружая его в глубь цветка, и высасывает нектар. Длина хоботка соответствует глубине чашечки цветка, в котором бабочка питается. Размеры хоботка бабочек разных видов различаются формой и

