


Скалярное произведение векторов

(проверка домашней работы на 22.05)

Определение. Скалярным произведением двух векторов называется произведение их *длин* на *косинус* угла между ними.



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \widehat{\vec{a} \vec{b}}$$

$$\text{a) } \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{B_1C_1} = |\overrightarrow{AD}| \cdot |\overrightarrow{B_1C_1}| \cdot \cos \widehat{\overrightarrow{AD} \overrightarrow{B_1C_1}} = a \cdot a \cdot \cos 0^\circ = a \cdot a \cdot 1 = a^2$$

$$\text{б) } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{C_1A_1} = |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{C_1A_1}| \cdot \cos \widehat{\overrightarrow{AC} \overrightarrow{C_1A_1}} = a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 180^\circ = a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot (-1) = -2a^2$$

$$\text{в) } \overrightarrow{D_1B} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{D_1B}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos \widehat{\overrightarrow{D_1B} \overrightarrow{AC}} = a\sqrt{3} \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 90^\circ = a\sqrt{3} \cdot a\sqrt{2} \cdot 0 = 0$$

$$\text{г) } \overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{BC_1} = |\overrightarrow{BA_1}| \cdot |\overrightarrow{BC_1}| \cdot \cos \widehat{\overrightarrow{BA_1} \overrightarrow{BC_1}} = a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 60^\circ = a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = a^2$$

$$\text{д) } \overrightarrow{A_1O_1} \cdot \overrightarrow{A_1C_1} = |\overrightarrow{A_1O_1}| \cdot |\overrightarrow{A_1C_1}| \cdot \cos \widehat{\overrightarrow{A_1O_1} \overrightarrow{A_1C_1}} = a\sqrt{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \cos 0^\circ = a\sqrt{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot 1 = a^2$$

$$\text{е) } \overrightarrow{D_1O_1} \cdot \overrightarrow{B_1O_1} = |\overrightarrow{D_1O_1}| \cdot |\overrightarrow{B_1O_1}| \cdot \cos \widehat{\overrightarrow{D_1O_1} \overrightarrow{B_1O_1}} = \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \cos 180^\circ = \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot (-1) = -\frac{a^2}{2}$$

$$\text{ж) } \overrightarrow{BO_1} \cdot \overrightarrow{C_1B} = |\overrightarrow{BO_1}| \cdot |\overrightarrow{C_1B}| \cdot \cos \widehat{\overrightarrow{BO_1} \overrightarrow{C_1B}} = a\sqrt{\frac{3}{2}} \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 150^\circ = a^2\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3}{2}a^2$$

Свойства скалярного произведения векторов:

1. $\vec{a}^2 \geq 0$; $\vec{a}^2 \neq 0$, если $\vec{a} \neq \vec{0}$

2. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (переместительный закон)

3. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$ (распределительный закон)

4. $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$ (сочетательный закон)

Скалярное произведение векторов в координатах

$$\vec{a} \{x_1; y_1; z_1\}$$

$$\vec{b} \{x_2; y_2; z_2\}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$$

$$\vec{a} \{4; 3; -2\}$$

$$\vec{b} \{-2; -4; 3\}$$

$$\vec{c} \{2; -6; 1\}$$

Вычислите:

$$\vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$\vec{b} \cdot \vec{c}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a}$$

$$\sqrt{\vec{b} \cdot \vec{b}}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

$$\cos \alpha = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

Косинус угла α между ненулевыми векторами $\vec{a}\{x_1; y_1; z_1\}$ и $\vec{b}\{x_2; y_2; z_2\}$

выражается формулой: $\cos \alpha = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$.

Косинус угла α между ненулевыми векторами $\vec{a}\{x_1; y_1; z_1\}$ и $\vec{b}\{x_2; y_2; z_2\}$

выражается формулой:
$$\cos \alpha = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

$\cos \alpha > 0$

α - острый

$\cos \alpha = 0$

α - прямой

$\cos \alpha < 0$

α - тупой

Задача 1. Пользуясь координатами векторов $\vec{a} \{5; -2; 8\}$, $\vec{b} \{4; -1; 6\}$, $\vec{c} \{2; 3; -5\}$, выяснить, каким является угол между парами векторов: острым, прямым или тупым.

а) $\widehat{\vec{a} \vec{b}}$

б) $\widehat{\vec{b} \vec{c}}$

в) $\widehat{\vec{a} \vec{c}}$

Задача 2. Найти величину угла между векторами \vec{a} и \vec{b} .

$$\cos \alpha = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

а) $\vec{a} \{\sqrt{2}; \sqrt{2}; 2\}$, $\vec{b} \{-3; -3; 0\}$

$$\cos \widehat{\vec{a} \vec{b}} = \frac{\sqrt{2} \cdot (-3) + \sqrt{2} \cdot (-3) + 2 \cdot 0}{\sqrt{\sqrt{2}^2 + \sqrt{2}^2 + 2^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2 + 0^2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \widehat{\vec{a} \vec{b}} = 135^\circ$$

б) $\vec{a} \{0; 5; 0\}$, $\vec{b} \{0; -\sqrt{3}; 1\}$

в) $\vec{a} \{-2,5; 2,5; 0\}$, $\vec{b} \{-5; 5; 5\sqrt{2}\}$

г) $\vec{a} \{-\sqrt{2}; -\sqrt{2}; -2\}$, $\vec{b} \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -1 \right\}$