БОУ ОО «Медицинский колледж»

Тема: «СП при раке желудка»

Дисциплина: Сестринское дело в терапии с курсом ПМП»

Специальность: сестринское дело

Преподаватель: Гусина В.И.

Рак желудка – это злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителиальной ткани.


Эпидемиология

 Рак желудка в России занимает устойчиво первое место среди других злокачественных новообразований.
Мужчины в 2 раза чаще. Возраст 40 – 60 лет.

Этиология: не установлена.



Рак желудка Антральный отдел желудка



Рак желудка

Предрасполагающие факторы (канцерогены)

- Экзогенные:
- Helicobacter pilori
- частое употребление в пищу консервантов, нитратов (не сами нитраты, а их производные)
- Эндогенные
- первичная язва рак, резекция желудка в анамнезе по поводу язвы, дисплазия эпителии по кишечному типу, рефлюкс жёлчи
- болезни пролиферации (аденоматозы)
- хронический атрофический гастрит с ахилией
- В-12 дефицитная анемия



Рак желудка



Полиповидный рак желудка

Клиника Ранние признаки:

- *Патентные формы:* без клинических проявлений
- Безболевые: синдром малых признаков: ощущение дискомфорта, небольшая слабость, диспепсические расстройства неопределённого характера; неприятные ощущения в эпигастральной области, быстрая насыщаемость пищей, снижение трудоспособности, бледность, раздражительность

Ранние признаки:

- Геморрагические формы: кровотечения различной интенсивности, симптомы анемии, в кале скрытая кровь
- **Болевые формы:** боль в эпигастральной области различной интенсивности (морфологически обычно язва рак)

Поздние признаки (по преобладанию какого – либо синдрома выделяют формы):

- Диспепсическая форма: чаще извращение аппетита длительное время (отвращение к пище и его виду), симптомы желудочной диспепсии (нарушение прохождения пищевого комка, упорная тошнота, отрыжка, изжога, ранняя рвота, тяжесть в эпигастрии, вздутие, истощение до кахексии)
- **Болевая форма:** различной интенсивности от слабой до «морфинной»


Поздние признаки:

- *Пихорадочная форма:* лихорадка различной интенсивности, продолжительности и типа с ознобами
- Анемическая: симптомы анемии
- *Отечная форма:* отёки различной локализации и интенсивности, чаще из-за дефицита белка
- Кишечная форма: запоры, поносы

- Цвет кожного покрова желтушно- бледный, землистый
- Истощение
- Одутловатость лица
- Утрата живого блеска глаз



- Увеличение лимфатических узлов над ключицей (метастаз Вирхова), в подмышечной области
- Мигрирующие тромбофлебиты



- Пальпируемая опухоль в эпигастрии
- Желтуха (усиленный гемолиз, токсический метастатический гепатит)
- Гепатомегалия
- Асцит

- Пальпируемая опухоль в эпигастрии
- Желтуха (усиленный гемолиз, токсический метастатический гепатит)
- Гепатомегалия
- Асцит

Особенности рака пилорического отдела:

- признаки нарушения его проходимости:
- быстрая насыщаемость,
- ощущение полноты в эпигастрии,
- рвота съеденной пищей

Особенности рака кардиального отдела:

- нарастающая дисфагия
- боль за грудиной
- срыгивание

Диагностика

- Рентгенологический симптом «дефекта наполнения»
- ФГДС
- эндосонография (определяет глубину инфильтрации стенки)
- Компьютерная томография
- УЗИ
- Опухолевые антитела

Лечение

- 1 и 2 стадии радикальная хирургическая операция
- 3 и 4 стадии комбинированная (лучевая + химиотерапия; или паллиативная операция), симптоматическая



Благодарю за внимание!