



Презентация на тему: Беременная медсестра.
Вредные влияния на плод

Во время беременности вредное воздействие на развитие сначала эмбриона, а потом и плода может оказывать множество различных факторов. Повреждающие факторы во время периода эмбриогенеза наиболее опасны и могут вызвать гибель, уродство или болезнь плода. Есть факторы, которые не вызывают патологических изменений у плода, но способствуют невынашиванию, что в конечном итоге все равно приводит к осложнениям у новорожденного. Некоторые факторы опасны в любые сроки беременности (радиация, инфекции, химические вредности). Желательно, чтобы женщина, планирующая беременность, не работала на вредном производстве.




Среди факторов, составляющих угрозу беременности медицинских сестер в ЛПУ особенно хочется выделить следующие:

1) Опасность поражения химическими реагентами (дезинфицирующие средства, лекарственные препараты, отходы анестезирующих газов). Лекарства попадают на кожу, в виде аэрозолей и паров нередко оказываются в зоне дыхания медсестры, вызывая различные заболевания профессионального характера, а так же бесплодие, выкидыши и аномалии развития плода, врожденные пороки органов и генетические заболевания.



2) Опасность инфицирования при работе с биологическими жидкостями, выделения пациентов после их изотопного исследования (моча, фекалии, рвотные массы).

**Микробиологические факторы,
опасные для беременной медсестры**



3) Опасность подвержения облучению (рентгеновские аппараты, отходы изотопов, радиоактивные). Облучение вызывает у плода генетические изменения во многих поколениях. беременная медсестра не должна помогать при исследовании в рентгеновском кабинете .



4) Стресс в результате воздействия неблагоприятной психологической обстановки. Вредные условия труда в здравоохранении подразумевают наличие стрессовых факторов. Врачи и медсестры постоянно общаются с тяжелобольными пациентами, видят их страдания, являются свидетелями смертельных случаев. Это вызывает хроническое эмоциональное напряжение, депрессии, тяжелые неврозы



Кроме того, в условиях нехватки персонала в больницах и поликлиниках медсестры часто подрабатывают санитарками. В этом случае они неизбежно контактируют с такими вредными факторами, как хлорамин, перекись водорода, аммиак и другими веществами, способными вызывать отравления, различные заболевания органов дыхания, в том числе и аллергического характера.

Чтобы обезопасить беременную медсестру, необходимо перевести её на более безопасную работу, например, в регистратуру.





Спасибо за просмотр!