

Степенная функция

Вы знакомы с функциями $y = x$, $y = x^2$, $y = x^3$,
 $y = \frac{1}{x}$ и т. д.

$y = x^p,$ - степенная функция

где p — заданное действительное число.

Познакомимся с некоторыми свойствами функций, которыми обладают, в частности, отдельные степенные функции.

1. Показатель $p = 2n$ — чётное натуральное число.

В этом случае степенная функция $y = x^{2n}$, где n — натуральное число, обладает следующими свойствами:

- область определения — все действительные числа, т. е. множество \mathbf{R} ;
- множество значений — неотрицательные числа, т. е. $y \geq 0$;
- функция $y = x^{2n}$ чётная, так как $(-x)^{2n} = x^{2n}$;
- функция является убывающей на промежутке $x \leq 0$ и возрастающей на промежутке $x \geq 0$;
- функция ограничена снизу;
- функция принимает наименьшее значение $y = 0$ при $x = 0$.





График функции $y = x^{2n}$

2. Показатель $p = 2n - 1$ — нечётное натуральное число.

График функции $y = x^{2n - 1}$

В этом случае степенная функция $y = x^{2n - 1}$, где n — натуральное число, обладает следующими свойствами:

- область определения — множество \mathbf{R} ;
- множество значений — множество \mathbf{R} ;
- функция $y = x^{2n - 1}$ нечётная, так как $(-x)^{2n - 1} = -x^{2n - 1}$;
- функция является возрастающей на всей действительной оси;
- функция не является ограниченной;
- функция не принимает ни наибольшего, ни наименьшего значения.




3. Показатель $p = -2n$, где n — натуральное число.

В этом случае степенная функция $y = x^{-2n} = \frac{1}{x^{2n}}$

обладает следующими свойствами:

- область определения — множество \mathbb{R} , кроме $x = 0$;
- множество значений — положительные числа $y > 0$;
- функция $y = \frac{1}{x^{2n}}$ чётная, так как $\frac{1}{(-x)^{2n}} = \frac{1}{x^{2n}}$;
- функция является возрастающей на промежутке $x < 0$ и убывающей на промежутке $x > 0$;
- функция ограничена снизу;
- функция не принимает ни наибольшего, ни наименьшего значения.



4. Показатель $p = -(2n - 1)$, где n — натуральное число.

В этом случае степенная функция $y = x^{-(2n-1)} = \frac{1}{x^{2n-1}}$, где $n \in \mathbb{N}$, обладает следующими свойствами:

вами:


— область определения — множество \mathbb{R} , кроме $x = 0$;

— множество значений — множество \mathbb{R} , кроме $y = 0$;


— функция $y = \frac{1}{x^{2n-1}}$ нечётная, так как $\frac{1}{(-x)^{2n-1}} = -\frac{1}{x^{2n-1}}$;

— функция является убывающей на промежутках $x < 0$ и $x > 0$;


— функция не принимает ни наибольшего, ни наименьшего значения.



5*. Показатель p — положительное действительное нецелое число.



а)



б)

В этом случае функция $y = x^p$ обладает следующими свойствами:

- область определения — множество неотрицательных чисел $x \geq 0$;
- множество значений — множество неотрицательных чисел $y \geq 0$;
- функция является возрастающей на промежутке $x \geq 0$;
- функция не является ни чётной, ни нечётной;
- функция ограничена снизу;
- функция принимает наименьшее значение $y = 0$ при $x = 0$.

6*. Показатель p — отрицательное действительное нецелое число.

В этом случае функция $y = x^p$ обладает следующими свойствами:

- область определения — множество положительных чисел $x > 0$;
- множество значений — множество положительных чисел $y > 0$;
- функция является убывающей на промежутке $x > 0$;
- функция не является ни чётной, ни нечётной;
- функция ограничена снизу.




Рис. 12

Задача 1 Найти наибольшее и наименьшее значения функции

$y = x^6$ на отрезке $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$.


► Функция $y = x^6$ на отрезке $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$

убывает при $x \in [-2; 0]$, возрастает при $x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$, следовательно, она

принимает наименьшее значение, равное нулю, при $x = 0$. Наибольшее значение этой функции — наибольшее из чисел $y(-2)$ и $y\left(\frac{1}{2}\right)$. Так как

$$y(-2) = (-2)^6 = 64, \quad y\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64},$$

то $y(-2) > y\left(\frac{1}{2}\right)$ и наибольшее значение равно 64. ◁



$$y = x^6$$

Задача 2 Построить график функции $y = -(x - 1)^5 + 2$.

график

► Областью определения функции является множество действительных чисел.

x	-2	-1	0	1	2
y	-32	-1	0	1	32

- 2) Симметрия относительно оси y
- 3) Сдвиг на 1 ед. вправо
- 4) Сдвиг на 2 ед. вверх




Рис. 13

124 Сравнить значения выражений:

- | | |
|---|--|
| 1) $3,1^7$ и $4,3^7$; | 2) $\left(\frac{10}{11}\right)^3$ и $\left(\frac{12}{11}\right)^3$; |
| 3) $0,3^8$ и $0,2^8$; | 4) $2,5^2$ и $2,6^2$; |
| 5) $\left(\frac{7}{9}\right)^{-2}$ и $\left(\frac{8}{10}\right)^{-2}$; | 6) $\left(\frac{14}{15}\right)^{-6}$ и $\left(\frac{15}{16}\right)^{-6}$; |
| 7) $(4\sqrt{3})^{-3}$ и $(3\sqrt{4})^{-3}$; | 8) $(2\sqrt[3]{6})^{-5}$ и $(6\sqrt[3]{2})^{-5}$. |