СПИД

ВИЧ

ВИЧ

- ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
- ВИЧ-инфекция - длительно текущая инфекция, развивающаяся в результате инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующаяся прогрессирующим поражением иммунной системы



СПИД

- СПИД – **синдром приобретенного иммунодефицита**
- Иммунодефицит. При возникновении заболевания происходит подавление иммунной системы и организм теряет способность сопротивляться различным инфекциям.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ:

ВИЧ не передается через укусы насекомых

ВИЧ не передается, если обнять ВИЧ-инфицированного или пожать ему руку

При ранней диагностике можно замедлить развитие заболеваний, вызванных ВИЧ-инфекцией

Подавляющее большинство ВИЧ-положительных женщин могут родить здоровых детей

ВИЧ не передается при совместном использовании посуды, полотенца. ВИЧ не опасен при совместном пользовании туалетом и ванной

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЕГО НЕ БЫЛО:

Избегать случайных сексуальных связей

Не использовать нестерильные шприцы при внутривенном введении лекарственных средств

Не пользоваться чужими средствами личной гигиены

Не делать татуировки и пирсинг в случайных салонах

Помнить о том, что СПИД есть



ПЕРИОД 1: «ОКНО»

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО ПОЛУГОДА С МОМЕНТА ЗАЖАЖЕНИЯ
(ЧАЩЕ ВСЕГО – 1,5 МЕСЯЦА)

Инкубационный период, когда ВИЧ только встраивается в клетки иммунной системы, подменяя их биологическую программу своей. Вирус ещё не определяется тестами, человек может не догадываться, что заражён – но уже передавать ВИЧ половым партнёрам.

ПЕРИОД 2: ПСЕВДОПРОСТУДА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: ОТ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ДО 2 МЕСЯЦЕВ
(ЧАЩЕ ВСЕГО – 1-2 НЕДЕЛИ)

Освоившись в новом организме, ВИЧ проявляет себя симптомами обычной ОРВИ. Часто люди с ВИЧ не обращают на них внимания. А зря. На этом этапе заражение уже могут подтвердить медицинские анализы.

- ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- БОЛЬ В ГОРЛЕ
- УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ И СЕЛЕЗЁНКИ
- ДИАРЕЯ
- СЫПЬ
- СТОМАТИТ

ПЕРИОД 3: БЕССИМПТОМНЫЙ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ТЕРАПИИ: ОТ 2 ДО 20 ЛЕТ
(ЧАЩЕ ВСЕГО 6-7 ЛЕТ)

ВИЧ активно размножается в организме, никак себя при этом не проявляя. Заражённые иммунные клетки больше не защищают, а сами воспроизводят вирус. ВИЧ меняет их ДНК, а затем убивает. Одновременно в иммунитете начинается «гражданская война»: здоровые клетки обнаруживают заражённых «предателей» и тоже убивают их. В результате иммунных клеток становится всё меньше, и организм остаётся без защиты. Необходимо лечение. Терапия не уничтожит вирус, но заблокирует его размножение, и иммунная система не пострадает. Приём современных медикаментов продлевает бессимптомный период до глубокой старости. Но для этого надо знать о своём положительном ВИЧ-статусе.

ПЕРИОД 4: СПИД

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
ЗАВИСИТ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ

Терминальная стадия – синдром приобретённого иммунодефицита. Иммунитет рушится. Организм больше не может противостоять условно-патогенным вирусам, бактериям, грибкам, которые обычно безобидно сосуществуют с человеком. Теперь они его убивают. Туберкулёз, пневмония, онкозаболевания – самые частые причины гибели. В стадии СПИДа вылечить пациента практически невозможно, можно только облегчить симптоматику.