

**СПИ**

**Д**


**И**

**ВИЧ**



# ВИЧ

- ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
- ВИЧ-инфекция - длительно текущая инфекция, развивающаяся в результате инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующаяся прогрессирующим поражением иммунной системы



# СПИД

- СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
- Иммунодефицит. При возникновении заболевания происходит подавление иммунной системы и организм теряет способность сопротивляться различным инфекциям.





# ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ:

---



ВИЧ не передается через укусы насекомых

---



ВИЧ не передается, если обнять  
ВИЧ-инфицированного или пожать ему руку

---



При ранней диагностике можно замедлить  
развитие заболеваний, вызванных ВИЧ-инфекцией

---



Подавляющее большинство ВИЧ-положительных  
женщин могут родить здоровых детей

---



ВИЧ не передается при совместном  
использовании посуды, полотенца. ВИЧ не опасен  
при совместном пользовании туалетом и ванной

---

# ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЕГО НЕ БЫЛО:

---



Избегать случайных сексуальных связей

---



Не использовать нестерильные шприцы  
при внутривенном введении лекарственных  
средств

---



Не пользоваться чужими  
средствами личной гигиены

---



Не делать татуировки и пирсинг  
в случайных салонах

---



Помнить о том, что СПИД есть

---



## ПЕРИОД 1: «ОКНО»



**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:** ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО ПОЛУГОДА С МОМЕНТА ЗАРАЖЕНИЯ  
(ЧАЩЕ ВСЕГО – 1,5 МЕСЯЦА)

Инкубационный период, когда ВИЧ только встраивается в клетки иммунной системы, подменяя их биологическую программу своей. Вирус ещё не определяется тестами, человек может не догадываться, что заражён – но уже передавать ВИЧ половым партнёрам.



## ПЕРИОД 2: ПСЕВДОПРОСТУДА



**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:** ОТ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ДО 2 МЕСЯЦЕВ  
(ЧАЩЕ ВСЕГО – 1-2 НЕДЕЛИ)

Освоившись в новом организме, ВИЧ проявляет себя симптомами обычной ОРВИ. Часто люди с ВИЧ не обращают на них внимания. А зря. На этом этапе заражение уже могут подтвердить медицинские анализы.



ВЫСОКАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА



БОЛЬ  
В ГОРЛЕ



УВЕЛИЧЕНИЕ  
ЛИМФАТИЧЕСКИХ  
УЗЛОВ И  
СЕЛЕЗЁНКИ



ДИАРЕЯ



СЫПЬ



СТОМАТИТ



### ПЕРИОД 3: БЕССИМПТОМНЫЙ



**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ТЕРАПИИ:** ОТ 2 ДО 20 ЛЕТ  
(ЧАЩЕ ВСЕГО 6-7 ЛЕТ)

ВИЧ активно размножается в организме, никак себя при этом не проявляя. Заражённые иммунные клетки больше не защищают, а сами воспроизводят вирус. ВИЧ меняет их ДНК, а затем убивает. Одновременно в иммунитете начинается «гражданская война»: здоровые клетки обнаруживают заражённых «предателей» и тоже убивают их. В результате иммунных клеток становится всё меньше, и организм остаётся без защиты. Необходимо лечение. Терапия не уничтожит вирус, но заблокирует его размножение, и иммунная система не пострадает. Приём современных медикаментов продлевает бессимптомный период до глубокой старости. Но для этого надо знать о своём положительном ВИЧ-статусе.



### ПЕРИОД 4: СПИД



**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:**  
ЗАВИСИТ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ

Терминальная стадия – синдром приобретённого иммунодефицита. Иммунитет рушится. Организм больше не может противостоять условно-патогенным вирусам, бактериям, грибкам, которые обычно безобидно сосуществуют с человеком. Теперь они его убивают. Туберкулёз, пневмония, онкозаболевания – самые частые причины гибели. В стадии СПИДа вылечить пациента практически невозможно, можно только облегчить симптоматику.