

ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ, ГОЛЕНАСТЫЕ

Выполнил: учитель географии, Якушева А.В.

ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

- ❑ >5 тыс. видов;
- ❑ Ареал: везде, кроме Антарктиды ➔ обитают в лесу, на деревьях и кустарниках;
- ❑ Вид: Небольшой размер, голова маленькая, оперение жесткое, крылья умеренной длины;
- ❑ В период размножения образуют пары;
- ❑ Птенцы – гнездовые;
- ❑ Питание: насекомые, семена культурных растений, некоторые всеядные (ворон, ворона, грач, сорока) – едят грызунов, лягушек, яйца и птенцов мелких птиц.

Сойка



Иволга



Ворон

GanjaFoto.ru/albums/59856



Большая райская птица



Козодой




Снегирь



самка



самец



дрозды



клесты



снегирь



овсянки



воробьи

Голенастые

- ❑ Внешность: крупные, удлинённый клюв и ноги, гибкая шея, маленькая голова, перьевого покрова рыхлый, большие и широкие крылья, хвост короткий;
- ❑ 118 видов;
- ❑ Ареал: везде, кроме Антарктиды и Арктики;
- ❑ Кладка: 2-6 яиц, инкубационный период – 17 до 32 суток, птенцы - гнездовые;
- ❑ Питание: рыбы, амфибии, ракообразные, водные насекомые, мелкие змеи.

Семейство цапель

□ 60 видов;



Цапля большая белая

Цапля египетская



Рыжая цапля



Семейство аистов

- 17-18 видов;
- Ареал: в основном тропики, Аист белый, черный, дальневосточный встречаются в европейской части РФ, на Дальнем Востоке.
- Кладка: от 3 до 5 яиц, инкубац.период – 34 суток;

Африканский марабу



Черный аист



Белый аист

