

T3 landing page

Интести[®]-бактериофаг

1 –й БЛОК (Главная страница, также раскрывается при нажатии кнопку с названием бренда)

Интести®-
бактериофаг

Когда
применять?

Почему Интести-
бактериофаг?

Как действует?

Как
применять?

Вопрос-ответ



Лечение и профилактика бактериальных кишечных инфекций¹

- ✓ Устраняет причину бактериального воспаления кишечника¹
- ✓ Разрешен к применению с рождения¹
- ✓ Сочетается с другими лекарственными препаратами¹
- ✓ Продается без рецепта



Сделайте тест на определение чувствительности к бактериофагам в лаборатории (привязать к странице <https://www.bacteriophage.ru/for-patient/analiz-na-chuvstvitelnost-k-bacteriophage/>)

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом

КОММЕНТАРИИ

- Предложить дизайн., используя синий цвет (пантон 2716 C) Соблюдать единую стилистику для всех блоков
- Упаковки и персонажи семьи будут отрисованы другим дизайнером отрисовать
- Шапка LP должна быть сквозной
- Привязать страницы в ИГ и во ВК. Пиктограммы должны быть сквозными или закреплены наверху
- Кнопка Где купить должна быть закреплена в шапке
- Кнопка про тест на чувствительность должна быть сквозной или закреплена наверху
- Дисклеймер должен по размеру соответствовать требованию закона о рекламе и быть сквозным или закреплён внизу



2 –й блок (кнопка Когда применять?)



Кишечные инфекции могут вызывать болезнетворные бактерии (патогенная кишечная палочка, клебсиеллы, стафилококки, сальмонеллы, шигеллы, и др.). Возбудители передаются через грязные руки, предметы, продукты питания, воду



Основные симптомы кишечных инфекций – тошнота, рвота, боли в животе и диарея, может повышаться температура. Боли в животе могут быть схваткообразными. Возникают непреодолимые позывы к опорожнению, частота стула становится частой. Симптомы могут появляться одновременно, но иногда заболевание развивается постепенно.

Лечебный эффект Интести®-бактериофага обеспечивается комплексным действием входящих в его состав бактериофагов против бактерий - кишечной палочки, протей, энтерококков, стафилококков, синегнойной палочки, шигелл, сальмонелл.

Чтобы выявить возбудителя бактериальной кишечной инфекции проводят микробиологическое исследование кала.

При обнаружении возбудителей важно определить их чувствительность к бактериофагам, в том числе к Интести®- бактериофагу. Это позволит правильно подобрать препарат.

Например, такой анализ выполняют в сетевых лабораториях «Инвитро», «Гемотест», KDL

Привязать слово «чувствительность» к странице <https://www.bacteriophage.ru/for-patient/analiz-na-chuvstvitelnost-k-bacteriophage/>

999888X7XXX
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Пол: Муж
Возраст: 40 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 01.10.2015 00:00
Дата поступления образца: 01.10.2015 20:07
Врач: 01.10.2015 21:45
Дата печати результата: 01.10.2015 22:05

ИН
Москва

Посев на пат. кишеч. флору, АЧ, ЧБФ
1 Salmonella enteritidis

Чувствительность к препаратам	1
AMPICILLIN	S
CEFOTAXIME	S
CEFTRIAxon	S
CIPROFLOXACTIN	S
NORFLOXACTIN	S
OFLOXACTIN	S

Комментарий

S - чувствительный.
R - устойчивый.
I - умеренно устойчивый.

Комментарии к заявке:

Локализация: Кал
Результаты исследований не являются диагнозом, необходи

На бланке теста будут обозначения в виде букв S или R
S (Sensitive) – чувствительный к бактериофагу
R (Resistant) – устойчивый к бактериофагу

КОММЕНТАРИЙ

- Отрисовать бланк по примеру (бланк во вложении, дополнительные комментарии в теле письма)
- Сделать подпись к рисунку : Пример результата анализа на чувствительность к Интести®-бактериофагу

3 –й блок (кнопка Почему Интести-бактериофаг)

Подходит для всей семьи, включая детей с рождения

Не повреждает нормальную кишечную микрофлору⁴

Обладает антибактериальным действием

Сочетается с другими лекарственными препаратами




Безопасен (редки побочные эффекты)

Опыт применения более 25 лет

4 –й блок (кнопка Как действует Интести-бактериофаг)

Вот так бактериофаги атакуют и разрушают бактерии дизентерии, сальмонеллы, кишечной палочки, протей, энтерококки, стафилококки, синегнойную палочку, которые вызывают бактериальное воспаление кишечника



Sources: Centers for Disease Control and Prevention; National Institutes of Health; World Health Organization

THE WALL STREET JOURNAL.

КОММЕНТАРИИ

- Рисунок будет отрисован другим дизайнером

После приема Интести®-бактериофага внутрь фаги быстро достигают очага инфекции – кишечника и **уничтожают** возбудителя бактериального воспаления кишечника

5 –й блок (кнопка Как принимать Интести-бактериофаг)



КОММЕНТАРИИ

Лечение

Когда	Кому	Способ применения и дозы (мл)		Схема применения		
		Внутрь	Ректально	Если рвоты нет	В случае рвоты	Если выраженных симптомов нет
		Доза на 1 прием	Доза на 1 прием			
Лечение бактериальных кишечных инфекций	Дети 0 - 6 месяцев	5	10	3 раза в день за 30 минут до еды * Первые дня рекомендуется развести препарат с небольшим количеством кипяченой воды 1:2. И, если не наблюдается нежелательных явлений (срыгивания, высыпания на коже) применять неразведенным	Ежедневно в виде высоких клизм (через газоотводную трубку или катетер) * Возможно сочетание способов применения внутрь и в виде высоких клизм	Рекомендуется замена одного приема внутрь на однократное введение препарата в виде клизмы (после опорожнения кишечника)
	Дети 6 - 12 месяцев	10-15	20	3 раза в день за 30 минут до еды		
	Дети 1 - 3 года	15-20	20-30			
	Дети 3 - 8 лет	20-30	30-40			
	Дети старше 8 лет и взрослые	30-40	50-60	4 раза в день за 30 мин до еды		

- ✓ Применяйте Интести®-бактериофаг по инструкции
- ✓ Курс лечения 7-10 дней
- ✓ Если после лечения улучшения не наступает, симптомы усиливаются или появляются новые, обязательно обратитесь к врачу

- Предложить дизайн для блока, при котором разделы лечение и профилактики будут размещаться удобно для восприятия. Например, сделать кликабельные кнопки Лечение и Профилактика. При раскрытии будут открываться схемы.
- Или предложить другое решение

5 –й блок (кнопка Как принимать Интести-бактериофаг_ продолжение)

Профилактика					
Когда	Кому	Способ применения и дозы (мл)		Схема применения	
		Внутри	Ректально	Если рвоты нет	В случае рвоты
		Доза на 1 прием	Доза на 1 прием		
При эпидемиологической ситуации	Дети 0 - 6 месяцев	5	Не применяется	Ежедневный прием разовой возрастной дозы	Препарат применяется по схеме лечения
	Дети 6 - 12 месяцев	10-15			
	Дети 1 - 3 года	15-20			
	Дети 3 - 8 лет	20-30			
	Дети старше 8 лет и взрослые	30-40			

✓ Продолжительность профилактического приема препарата зависит от эпидситуации и определяется врачом

6 –й блок (кнопка Вопросы и ответы)

Можно ли принимать Интести-бактериофаг одновременно с другими лекарственными препаратами?

Можно ли принимать Интести-бактериофаг в период беременности и грудного вскармливания?

и другие...

Данные ответы не являются телемедицинской услугой. Мы не консультируем, а лишь помогаем лучше разобраться в особенностях препарата Интести-бактериофаг

КОММЕНТАРИИ

- Предложить оформление блока и его навигацию: как будут показываться вопросы и ответы на них

Список вопросов и ответов в файле Word во вложении

Переход с кнопки Где купить?

Выберите интернет-аптеку или сервис по бронированию

apteka.ru

Сбер Еаптека

здравсити 

ВСЕ  АПТЕКИ

Ютека

Сделать кнопку

Источники информации

(при нажатии разворачиваются источники информации)

Источники размещаются списком, т.е.
нажимаются

¹ Согласно инструкции препарата Интести-бактериофаг

² Хохлова Н.И., Краснова Е.И. и соавт. Острые кишечные инфекции вирусной и бактериальной этиологии у детей: современные возможности диагностики и терапии, роль метабиотиков. Лечащий врач. 2018; 6

³ Ройтберг Г.Е. Внутренние болезни. Система органов пищеварения: учеб. пособие / Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : МЕДпресс-информ 2007 —560с.

⁴ Халли П. Фебвр,1 Сангита РАО,2 Мелинда Гиндин,1 Натали Д. М. Гудвин,1 Элайджа Файнер,1 Хорхе С. Виванко,3 Шен Лу,1 Дэниел К. Мантер,4 Тейлор К. Уоллес,5,6,* и Тиффани л. Вейр Исследование фагов: влияние дополнительного потребления бактериофагов на воспаление и кишечную микробиоту у здоровых взрослых Питательные вещества. 2019 Mar; 11 (3): 666.

Регистрационный номер: № 001999 от 10.08.2020 г.

Форма выпуска: раствор для приема внутрь и ректального введения

4 флакона по 20 мл в пачке с инструкцией по применению

1 флакон по 100 мл в пачке с инструкцией по применению