



Сурок Байбак

Выполнила Братышева Диана

Учитель: Братышева Н.С.





- грызун рода [сурков](#), обитатель целинных степей Евразии.
- длина его тела 50—70 см, масса нажировавшихся самцов достигает 10 кг. Тело у байбака толстое, неуклюжее, на коротких, сильных лапах, вооружённых крупными когтями. Голова большая, уплощённая, шея короткая.



- От других сурков байбака легко отличить по короткому хвосту (не более 15 см) и однотонной песчано-жёлтой окраске. Из-за тёмных кончиков остевых волос его спина покрыта тёмно-бурой или чёрной рябью, сгущающейся на затылке и на верхней части головы. Щёки светло-рыжеватые; под глазами бурые или чёрные пестрины. Брюхо заметно темнее и рыжее боков; конец хвоста тёмно-бурый. Встречаются сурки-альбиносы. Линька у байбаков один раз в год; начинается в мае и заканчивается (у старых сурков) к концу августа, иногда затягиваясь до сентября.

- В прошлом байбак был широко распространён по степной и отчасти лесостепной зоне от Венгрии до Иртыша, но под влиянием распашки целинных земель исчез почти повсюду, сохранившись лишь по участкам нетронутой целины на Дону. Сейчас обитает в многих областях России, и на в Казахстане.



- 
- A photograph of a brown rabbit sitting in a field of green grass and plants. The rabbit is the central focus, looking towards the left. The background is a dense field of green vegetation, including tall grasses and leafy plants. The lighting is bright, suggesting a sunny day.
- Питаются байбаки растительными кормами.
 - Байбак — природный обитатель равнинных злаково-разнотравных степей.
 - Живут байбаки большими многолетними колониями, устраивая для жилья норы разного назначения и сложности.
 - Из зимней спячки байбаки выходят в конце февраля — начале марта.
 - В марте—апреле у байбаков наступает брачный период. Беременность длится 30—35 дней; обычно в выводке 3—6 детёнышей

