

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Санкт-Петербургский медико-технический колледж
Федерального медико-биологического агентства»

«ПТСР у пациентов с чеченским синдромом»

Выполнила: студентка гр. С-412
Ховалыг И.Г.

Посттравматическая стрессовое расстройство

- Это представляют собой целостный комплекс симптомов нарушение психической деятельности возникший в результате единоразового или повторяющегося внешнего сверхсильного травмирующего воздействия на психику человека.

Причины ПТСР

1. Военные конфликты
 - Военный невроз
 - Вьетнамский невроз
 - Афганский невроз
 - Чеченский синдром
2. Плен
3. Жертвы сексуального насилия
4. Свидетелей убийств

Чеченский синдром

- Это новое название старого синдрома, ведь как уже говорилось ранее, войн, затронувших практически весь мир, было несколько




Этапы

- Первый этап: проявляется после психологической травмы
- Второй этап: начинает проявляться примерно через несколько часов после случившегося
- Третий этап: когда солдаты возвращаются домой с войны все успокаиваются и, кажется, что они смогут вернуться к нормальной жизни.

Признаки

- Бессонница
- Снижение самоконтроля
- Повышенная агрессивность
- Неадекватность восприятия мира



Лечение

- Медикаментозная
- Психотерапевтическая (транквилизаторы, гипнотики, антидепрессанты, нейролептики).

Роль медсестры реабилитации ПТСР заключается в уходе психической поддержки.

Спасибо за внимания!!!

