

Простейшие функции

Операция суперпозиции

Алгоритмический процесс можно рассматривать как процесс вычисления значений некоторой функции f

Такие функции называются
ВЫЧИСЛИМЫМИ

Интуитивное понятие **вычислимой функции** заменим на точное понятие **частично рекурсивной функции**

Простейшие функции

Рассмотрим некоторый набор простейших функций, вычислимость которых очевидна

Простейшими функциями называются следующие арифметические функции:

1) Нулевая функция

$$O^n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$O(x) = 0$$

2) Функция следования

$$S(x) = x + 1, x \in \mathbb{N}$$

3) Функция проецирования (выбора)

$$I_m^n(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_m$$

Замечание

Вычислимость функции проецирования обеспечивается нашей способностью найти в строке

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

место с номером m и указать число на этом месте

Операция подстановки (суперпозиции)

Пусть заданы арифметические функции:

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \phi(y_1, y_2, \dots, y_m)$$

Говорят, что функция $\psi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ получена из функций ϕ и f_1, f_2, \dots, f_m операцией подстановки (суперпозиции), если:

$$\psi(x_1, \dots, x_n) = \phi(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$$

Обозначение:

$$\psi = \text{Sub}(\phi; f_1, \dots, f_m)$$

Операция подстановки (суперпозиции)

$$\psi(x_1, \dots, x_n) = \varphi(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$$

Пример 1

$$\varphi(x, y) = x - y$$

$$f_1(b) = b^2$$

$$f_2(a, c) = 4ac$$

$$\psi(a, b, c) =$$

Операция подстановки (суперпозиции)

$$\psi(x_1, \dots, x_n) = \varphi(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$$

Р Пример 1

$$\varphi(x, y) = x - y$$

$$f_1(b) = b^2$$

$$f_2(a, c) = 4ac$$

$$\begin{aligned}\psi(a, b, c) &= \text{Sub}(\varphi; f_1, f_2) = \\ &= \varphi(f_1(b), f_2(a, c)) = \\ &= \varphi(b^2, 4ac) = \\ &= b^2 - 4ac\end{aligned}$$

Операция подстановки (суперпозиции)

$$\psi(x_1, \dots, x_n) = \varphi(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$$

Правильное применение суперпозиции:
необходимо соблюдать требования к набору аргументов каждой функции

$\psi(x_1, \dots, x_n)$
 $f_1(x_1, \dots, x_n)$
...
 $f_m(x_1, \dots, x_n)$

**один и тот же
набор аргументов
 (x_1, \dots, x_n)**

$\varphi(y_1, \dots, y_m)$

другой набор из m аргументов

Операция подстановки (суперпозиции)

$$\psi(x_1, \dots, x_n) = \varphi(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)) \\ \varphi(y_1, \dots, y_m)$$

Пример 1

$$\varphi(x, y) = x - y \\ f_1(b) = b^2 \\ f_2(a, c) = 4ac$$

Преобразуем функции f_1 и f_2 так, чтобы они удовлетворяли требованиям к аргументам для применения суперпозиции

$$F_1(a, b, c) = \text{Sub}(f_1; I_2^3(a, b, c)) = f_1(I_2^3(a, b, c))$$

$$F_2(a, b, c) = \text{Sub}(f_2; I_1^3(a, b, c), I_3^3(a, b, c)) = \\ = f_2(I_1^3(a, b, c), I_3^3(a, b, c))$$

$$\psi(a, b, c) = \varphi(F_1(a, b, c), F_2(a, b, c))$$

Корректно

Замечание

Такое применение функции проецирования предложил К.Гёдель (1934)

Все функции f_i , $i = 1, \dots, m$ зависят от n переменных, а функция Φ имеет m переменных (по количеству функций f_i)

Результат подстановки, функция Ψ зависит от n переменных

Добиться выполнения условия на количество аргументов у функций можно введением фиктивных переменных и применения функции проецирования

$$I_m^n$$

Пример 2

Записать корректно подстановку

$$\psi(x, y, z) = \varphi(f_1(x), f_2(x, y, z), y, z)$$

Решение

$$F_1(x, y, z) = f_1(I_1^3(x, y, z))$$

$$F_2(x, y, z) = f_2(x, y, z)$$

$$F_3(x, y, z) = I_2^3(x, y, z)$$

$$F_4(x, y, z) = I_3^3(x, y, z)$$