

Веракол

- Веракол за счет своего спазмолитического действия восстанавливает перистальтику ЖКТ и великолепно блокирует воспалительные процессы, происходящие в организме животных



Веракол

Расстройство дефекации;
Интоксикация (отравления);
Гастроэнтерит;
Энтерит;
Гастрит;
Спастический колит;
Диспепсия.

Веракол

- ▣ Раствор Веракола вводят животным внутримышечными и подкожными инъекциями в острых случаях — 1 – 3 раза в день до стабилизации состояния. Продолжительность лечения 7 – 10 дней. При необходимости курс повторяют. Разовая доза препарата на одно животное составляет:

Собакам средних и крупных пород - от 2,0 мл до 4,0 мл;

Собакам мелких пород – от 0,5 мл до 2,0 мл.

Веракол

- Веракол в таблетках назначают внутрь при гастроэнтерите легкой и средней степени тяжести 2 раза в день, при тяжелом течении заболевания — 3 раза в день. Длительность курса лечения 5 – 7 дней. Разовая доза препарата на одно животное составляет:
собакам крупных пород 3 таблетки
собакам средних пород 2 таблетки

Лиарсин

- Нормализации обменных процессов в организме животных;
- Оказания неспецифического иммуностимулирующего действия;
- Улучшения функции почек и поджелудочной железы;
- Восстановления функционального состояния слизистой кишечника и работы ЖКТ;
- Стимуляции процессов регенерации.



Лиарсин

▣ Назначение

Заболевания послеродового периода;
Пироплазмоз (в период восстановления);
Панкреатит;
Отравление;
Возрастные заболевания;
Фурункулез;
Скрофулезные заболевания кожи с мокнущими экземами;
Дерматит;
Дерматоз;
Дегенеративное заболевание почек;
Цирроз печени;
Гепатит;
Дистрофия жировая.

Лиарсин

В/М, П/К ИНЪЕКЦИИ

ВНУТРЬ

Собакам средних и
крупных пород - от 2,0
мл до 4,0 мл;

собакам крупных пород 3
таблетки

Собакам мелких пород
– от 0,5 мл до 2,0 мл.

собакам средних пород 2
таблетки

Лиарсин

- ▣ Продолжительность лечения таблетками составляет не более 30 дней.
- ▣ Данное лекарство в таблетках в острых случаях применяют от 2 до 3 раз в сутки.

Ковертал



- ▣ Назначают с лечебной целью при острых и хронических гепатитах, жировой дегенерации печени, токсических поражениях печени, инфекционных и инвазионных заболеваниях в качестве лекарственного СРЕДСТВА сопутствующей терапии.

Ковертал

- ▣ Ковертал раствор для инъекций вводят животным подкожно или внутримышечно. Разовая доза собакам составляет 0,1 мл препарата на 1 кг веса животного (0,5 – 4 мл).
- ▣ В острых случаях болезни Ковертал раствор для инъекций применяют 1 – 2 раза в сутки до исчезновения клинических признаков заболевания, при хроническом течении болезни — 2 – 3 раза в неделю. Длительность курса лечения при острых заболеваниях составляет 10 – 14 дней, при хронических — 3 – 4 недели.

Гепатопротекторы

- ▣ **гепатопротекторы** – препараты, основной функцией которых является предохранение клеток печени от повреждающего воздействия различных факторов, в том числе при отравлении.
- ▣ Рассмотрим некоторые препараты

Гепатопротекторы

- Фосфоглив по 1-2 капсуле, 2-3 раза в день, с едой, 1 месяц
в/в 1 мл на 10 кг веса мл 2 раза в день, 10 дней
- Эссенциале Форте Н – в/в крупной собаке по 5-10 мл
- Лив-52 – 1-2 табл 2-3 раза в день, крупным собакам по 3 тб, минимум 1 месяц

Гепатовет



- ▣ Назначают собакам для профилактики и комплексного лечения острых и хронических заболеваний печени различной этиологии, в том числе после отравлений.

Гепатовет

- ▣ **ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
внутри 2 – 3 раза в день в течение 3 – 5 недель

До 10 кг – 1 мл

11 – 20 кг – 2 мл

21 – 30 кг – 3 мл

31 – 40 кг – 4 мл

Более 41 кг – 5 мл

При необходимости курс лечения повторяют
через 2 – 3 недели.

Карсил

- ▣ Большой собаке, весом более 40 кг, можно давать по три драже трижды в день при лечении тяжелых поражений печени.
- ▣ Для лечения более легких воспалений, достаточно будет одного драже трижды в день. В профилактических целях назначают в сутки по два драже. Для более мелких собак дозу нужно высчитывать, исходя их расчета – 2 драже в сутки на 10 кг веса животного во время лечения и 0,5 драже для профилактики. Курс лечения может быть довольно длительным и составляет не менее 3 месяцев.
- ▣ Драже дают собаке за полчаса до еды. Лучше не давать их беременной или кормящей суке. Редко могут быть побочные эффекты в виде диареи, тошноты или аллергические реакции в виде сыпи и зуда.

Глюкоза 40%



- Назначают при отравлении наркотиками, синильной кислотой и ее солями, окисью углерода, анилином, мышьяковистым водородом и другими веществами
- гепатит, цирроз, дистрофия и атрофия печени, декомпенсация сердечной деятельности, отек легких, геморрагический диатез и многие другие патологические состояния.

Глюкоза 40%

- ▣ **ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
- ▣ В зависимости от тяжести заболевания препарат вводят животным внутрь или внутривенно 1 – 2 раза в день в следующих дозах— 5 – 50 мл на животное.

Глюкоза 5%

- ▣ Глюкоза 5% -в/в, п/к 50-500 мл 1-2 раза в день

АНТИТОКС



- При отравлениях любой этиологии: нитратами, нитритами, мышьяком, ртутью, свинцом, синильной кислотой, солями йода и брома.

АНТИТОКС

- Препарат вводят медленно, внутривенно, внутримышечно, подкожно или внутрибрюшинно, один раз в день до выздоровления в дозе 5 мл

Гамавит



- Гамавит для собак – это комплекс биологически активных веществ, благодаря которым в организме оптимизируются обменные процессы (витаминный, белковый и минеральный).

Гамавит

- С Целью профилактики препарат вводят внутримышечно, подкожно, внутривенно, можно давать и с питьем в расчете 0,1 мл на 1 кг массы тела животного. С лечебной целью понадобится 0,3-0,5 мл на 1 кг массы.
- При тяжелых отравлениях препарат вводят однократно внутривенно, подкожно или внутрибрюшинно в пятикратной дозировке.

Витам



- ▣ Витам для собак – это витаминно-аминокислотный комплекс с глюкозой
- ▣ С лечебной целью вводят в дозе 3-5 мл на 10 кг веса животного два раза в сутки на протяжении 3-5 дней..