Презентация на тему: «Проведение приема Геймлиха у взрослых и детей.»

Выполнила:

Студентка 3 курса 2 группы Самединова Ф.А.

Проверила:

Преподаватель по основам реаниматологии Аджимамбетова Н.С.

Прием Геймлиха.

- Метод Геймлиха применяется при поперхивании, когда человек нуждается в немедленной помощи. Обычно в таком состоянии цвет лица пострадавшего становится сине-красным, как ещё говорят, цианотичным. Человек хватается за своё горло и не в состоянии разговаривать или вдыхать воздух. В таких ситуациях очень важно хорошо знать метод Геймлиха. Самому себе также можно оказать помощь этим способом.

Общее описание метода Геймлиха.

- Что же предпринять, если рядом с вами кто-нибудь поперхнулся? Прежде всего, не впадайте в панику.
- Выполните следующие действия:
- Если поперхнувшийся человек в сознании и стоит на ногах, станьте сзади него. Обхватите пострадавшего обеими руками.
- Сожмите одну из рук в кулаке и большим пальцем кулака придавите место живота потерпевшего между пупком и рёбрами. Эта область живота называется эпигастральной.
- Ладонь другой руки кладём сверху кулака и толкающим движением вверх вдавливаем его в живот.

Общее описание метода Геймлиха.

- Выполняя это движение, следите за тем, чтобы ваши руки сгибались в локтях, но при этом грудь пострадавшего не передавливалась. Повторяем применение метода Геймлиха до полного освобождения дыхательных путей поперхнувшегося человека.



Метод Геймлиха: описание необходимых действий, если человек без сознания

- Если поперхнувшийся человек потерял сознание или подойти к нему сзади не представляется возможным, помочь ему всё ещё можно. Чтобы оказать помощь пострадавшему, выполняйте следующие действия:
- Положите человека на спину.
- Примите позу сидя на пострадавшем, лицом к его голове. Старайтесь сидеть на бёдрах, чтобы не давить сильно на грудь и живот человека, нуждающегося в помощи.
- Положите ваши руки друг на друга. Нижняя рука при этом должна располагаться между пупком и рёбрами поперхнувшегося человека.
- Надавливая всем телом, совершайте активные толчки в эпигастральной области потерпевшего по направлению вверх. Следите, чтобы голова пострадавшего смотрела прямо, а не была повернута набок.
- Повторяйте ваши движения до тех пор, пока человек не начнёт дышать самостоятельно.
- Если человек, которому вы оказываете помощь, так и не приходит в себя, то проводите сердечно-легочную реанимацию до приезда врачей. Осмотр врачей необходим будет пострадавшему и в случае восстановления дыхания и сознания

Метод Геймлиха при инородных телах дыхательных путей у детей.

Если поперхнулся и не может дышать ребёнок, необходимо произвести следующие действия:

- Уложите пострадавшего ребёнка на спину на пол.
- Встаньте на колени у него в ногах.
- Приложите средние и указательные пальцы ваших обеих рук на живот ребёнка между пупком и рёберной дугой.
- Сделайте активное надавливающее движение к диафрагме ребёнка вверх. Следите, чтобы грудная клетка была свободной, не ощущала на себе давления.
- Необходимо повторять до очистки дыхательных путей.

Оказание помощи маленьким детям.

- Есть и другой метод помощи поперхнувшемуся ребёнку, особенно он подходит для детей младшего возраста. Выполняется так:
- Положите ребёнка лицом вниз, так чтобы его лицо лежало на вашей ладони, а ноги находились по разные стороны ваших предплечий.
- Несильно похлопывайте ребёнка по спине между лопатками ладонью, пока дыхательные пути не будут освобождены.
- Если этот метод не даёт результатов, продолжайте оказывать помощь первым способом приёма Геймлиха.
- Если ребёнок не возвращается в сознание и не дышит, необходимо начать проводить сердечно лёгочную реанимацию до приезда врачей.
- После попёрхивания ребёнком доктор проводит осмотр и при успешном избавлении от инородного тела.

5X

Спасибо за внимание!