

ГУЗ ТО ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

«ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА»

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ИСАЙЧЕВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА

АНЕКДОТ



ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ
ХОРОША ТЕМ, ЧТО
ПОЧТИ НЕ ОСТАВЛЯЕТ МЕСТА
ДЛЯ УГРЫЗЕНИЙ СОВЕСТИ.

ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЛИБО ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ

(ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ РАНЕЕ),

ЛИБО БОЛЕЕ ИЗВЕСТНАЯ КАК ДЭП

ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОД СОБОЙ МНОГООЧАГОВОЕ ИЛИ ДИФФУЗНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРОЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСОМ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. НАЛИЧИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ЖАЛОБ (ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, УТОМЛЯЕМОСТЬ, СНИЖЕНИЕ ПАМЯТИ) И ОБЪЕКТИВНЫХ ЖАЛОБ.

ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ХИМ) ЯВЛЯЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (АГ) В СОЧЕТАНИИ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ.

ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ СТАДИИ ХИМ:

1 СТАДИЯ:

ПРЕОБЛАДАЮТ ПРИЗНАКИ АСТЕНИИ (БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, ЛЕГКАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ШУМ В ГОЛОВЕ, НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ХОДЬБЕ, НАРУШЕНИЯ СНА)

2 СТАДИЯ

ВЫРАЖЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ (НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ, СПОСОБНОСТИ ПЛАНИРОВАТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ), ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ (ДЕПРЕССИЯ, ПОВЫШЕННАЯ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ РАСТОРМОЖЕННОСТЬ), НАРУШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ. НА ЭТОЙ СТАДИИ СТРАДАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНОГО, ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

3 СТАДИЯ

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (ГРУБОЕ СНИЖЕНИЕ КРИТИКИ, РАСТОРМОЖЕННОСТЬ, ВОЗБУДИМОСТЬ, ВЗРЫВЧАТОСТЬ, СНИЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОСКУДЕНИЯ), НАРУШЕНИЯ ГЛОТАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА, РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ, ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ХОДЬБЫ И РАВНОВЕСИЯ С ЧАСТЫМИ ПАДЕНИЯМИ, НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ. НАРУШАЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, БОЛЬНЫЕ ПОСТЕПЕННО УТРАЧИВАЮТ СПОСОБНОСТЬ ОБСЛУЖИВАТЬ СЕБЯ И НУЖДАЮТСЯ В ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ.

ДИАГНОСТИКА:

1. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ЯВЛЯЕТСЯ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ, ЭФФЕКТИВНО ВЫЯВЛЯЮЩЕЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И СТРУКТУРЫ СОСУДОВ.
2. ОБЪЕКТИВНУЮ КАРТИНУ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТАКЖЕ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ СКОРОСТЬ КРОВотоКА, СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДИСТЫХ СТЕНОК
3. РКТ/МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА

ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХИМ:

- АНТИОКСИДАНТЫ (МЕКСИДОЛ)
- НООТРОПЫ (ГЛИЦИН, КОРТЕКСИН, МЕМАНТИН)
- ВАЗОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (БЕТАГИСТИН, ПЕНТОКСИФИЛЛИН)
 - АНТИДЕПРЕССАНТЫ (СИОЗС)
 - АНКСИОЛИТИКИ (ТЕРАЛИДЖЕН, ТИОДАЗИН)

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ
НАМ НУЖНЫ:

- В\В ИНФУЗИИ
- В\М ИНЪЕКЦИИ
- ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
- РАБОТА ПСИХОЛОГА
 - ЗАНЯТИЯ ЛФК
- ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕДОМ
- ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
 - КОНТРОЛЬ АД, ЧСС



СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!





Хорошим заполняйте память,
плохое победит склероз.