

*С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ*



*КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
С.Д. АСФЕНДИЯРОВА*

ДОНОВАНОЗ

**выполнила: Сатылган Акерке
факультет: ОМ
курс:2
Группа:15-2к
Проверила: Бегадилова Толкын**

План:

- ▶ I вступление
- ▶ II
- ▶ 1. что такое Донованоз
- ▶ 2. пути передачи
- ▶ 3. причины
- ▶ 4. факторы риска
- ▶ 5. симптомы
- ▶ 6. чем опасен, диагностика донованоза
- ▶ 7. лечение, профилактика
- ▶ III заключение
- ▶ Список литературы

«Донованоз»

атауынан басқа бұл ауру венереологиялық гранулема, бесінші венереологиялық ауру, тропикалық шап гранулемасы, жыныс гранулёмасы, шап гранулёмасы деп аталады. «гранулема» атауы латынның *granulum* — «ұрық» сөзінен шыққан, бұл атау ауру кезінде жыныс мүшелеріне ұрыққа ұқсас безеулер шығатындықтан шыққан.



ВЕНЕРЕОЛОГИЛЫҚ ГРАНУЛЕМА —

**басқа да венереологиялық
ауруларға тән жолмен берілетін
созылмалы инфекция, ол ең
алдымен жыныстық жолмен
беріліп адам ағзасында баяу
даму үстінде болады.**

**Венереологиялық
гранулемамен ересек адамдар
ғана ауырады, балаларға бұл
ауру жұқпайды.**

► Венереологиялық
гранулеманың
(донованоздың) қоздырғышы,
Донован денесі, ауру соған
байланысты аталғанол
сондай-ақ
Calymmatobacterium
granulomatis Арагана-Вианна
таяқшасы деп аталады. Бұл
ұсақ (1—2 мкм) сопақша
келеген бактерия (сырт пішіні
жұмыртқаға ұқсас). Ауру
адаммен қарым-қатынасқа
түскенде бактериялар жыныс
мүшелерінің, басқа
жерлердегі терісіне еніп,
ауру тудырады.



**Ресейде венереологиялық
гранулема сирек кездеседі, себебі
аталған ауру жылы және ылғалды
климатты тропиалық елдерге тән.
Венереологиялық гранулема әсіресе
Папуа-Жаңа Гвинеяда, Оңтүстік
Индияда, Оңтүстік Африкада,
Кариб бассейні елдерінде,
Австралия мен Бразилияның
жекелеген елдерінде. Америка мен
Европада венереологиялық
гранулеманың тек тасып әкелінген
жағдайлары кездеседі.**

СИМПТОМЫ

- ✓ Когда возбудитель донованоза попадает в кожу человека или слизистую оболочку начинается воспалительный процесс. Появляются небольшие в диаметре узелки, которые с течением болезни увеличиваются до четырех - пяти сантиметров.
- ✓ При донованозе наблюдается следующая клиническая картина: проявляются все признаки общей интоксикации организма – повышается температура тела, появляется озноб, тошнота, периодическая рвота.

✓ Чаще всего эти осложнения наблюдаются у женщин, и объясняется это отличным от мужского анатомическим строением половых органов и всей мочеполовой системы.

ДИАГНОСТИКА

- ✓ С язвенных краев берутся материалы и делаются мазки для микроскопического исследования на донованоз, их окрашивают по методу Романовского-Гимзе или Лейшману.
- ✓ При диагностировании донованоза обязательным считается микроскопическое исследование, выявляющее бледную трепонему и стрептобациллу Дюкрея-Петерсона.



✓ Статистика мәліметтері бойынша венереологиялық гранулеманы ауыратын адаммен бір рет қорғанбаған қарым-қатынас кезінде жұқтырып алу қаупі 1-50 % аралығында. Соынмен бірге ағзаға түскен бактерияға ылғалды климат және қоршаған ортаның жеткілікті мөлшерде ыстық болуы қажет екенін ескеру қажет. Сондықтан тропикалық елдерде демалып Ресейге келген венереологиялық гранулеманы жұқтырып алған «демалушы» жыныстық қатынаста да, тұрмыстық жағдайда да тұрақты серіктестері үшін қауіпсіз деп есептеледі.

ПРОФИЛАКТИКА

- Профилактикой донованоза является числовое снижение половых партнеров, полное исключение половых актов без контрацептивной защиты, соблюдение личной гигиены, и своевременное выявление и грамотное лечение инфекции.



ЛЕЧЕНИЕ

□ Лечение донованоза проводится в условиях амбулаторных. Больному назначается прием антибактериальных препаратов из разряда тетрациклинов, эритромицинов, гентомицинов, линкомицинов и ампицилинов.

