




Влияние поллютантов на возникновение мутаций у бактерий

S. Lynnt

Работу выполнили студенты 2курса:
Дробот Валерия, Яровая Екатерина ,
Куликов Максим, Выростков Владимир
Руководители проекта: Селиверстова Е.Ю., аспирант,
Сазыкина М.А., д.б.н, профессор кафедры биохимии и
микробиологии

Актуальность

Панрезистентные штаммы – это штаммы микроорганизмов, которые устойчивы ко всем известным классам антибиотиков.



Основные источники поступления антибиотиков в биосферу и глобальная сеть путей горизонтального переноса генов устойчивости к ним.

Красными стрелками показано поступление антибиотиков, **оранжевыми** — перемещение антибиотиков и генов устойчивости к ним, **голубыми** — передача только генов устойчивости




Схема переноса генов устойчивости к антибиотикам из природных бактерий в клинические штаммы


Цель и задачи

□ Цель:

Изучить влияние поллютантов на возникновение рифампицин-устойчивых мутантов бактерий рода *Pseudomonas*.


□ Задачи:

1. Проследить влияние солей тяжелых металлов (HgCl_2 , CuSO_4) на возникновение рифампицин-устойчивых мутантов бактерий рода *Pseudomonas*.
2. Проследить влияние пестицидов (клопиралид и глифосат) на возникновение рифампицин-устойчивых мутантов бактерий рода *Pseudomonas*.
3. Проследить влияние антисептических препаратов (хлоргексидина, диоксидина) на возникновение рифампицин-устойчивых мутантов бактерий рода *Pseudomonas*.
4. Проследить влияние антибиотиков (ампициллина, тетрациклина) на возникновение рифампицин-устойчивых мутантов бактерий рода *Pseudomonas*.
5. Сравнить действие поллютантов различных групп на выбранный штамм.
6. Проанализировать полученные результаты.
7. Сделать выводы по данным эксперимента.




Объект исследования

- Объектом нашего исследования является штамм *Pseudomonas putida*, выделенный из донных отложений импактной зоны Новочеркасской ГРЭС.
- Предметом исследования является частота встречаемости рифампицин-устойчивых мутантов *Pseudomonas putida*.



21-часовая культура
Pseudomonas putida



Pseudomonas putida


Материалы и методы



- Получение рифампицин-резистентных мутантов *P. Putida*
- Культура была получена путем роста клеток до поздней логарифмической фазы роста в среде M9, содержащей глюкозу и гидролизат казеина, в конечных концентрациях 0,2% и 0,4% соответственно.
- Полученную культуру разводили свежей средой M9 до $1 \cdot 10^8$ кл/мл и подращивали в течение 18 часов

□ Анализ рифампицин-резистентных мутантов


Ночную культуру разводили средой M9 до плотности $2 \cdot 10^9$ кл/мл, 100 мкл полученной суспензии вносили на чашки с LB с добавлением M9 и рифампицина. Количество выросших колоний учитывали через 72 ч. после начала инкубации.



Анализ влияния антисептических препаратов




- **1. Хлоргексидин** — лекарственный препарат, антисептик, в готовых лекарственных формах используется в виде биглюконата (Chlorhexidini bigluconas). Хлоргексидин успешно применяется в качестве кожного антисептика и дезинфицирующего средства уже более 60 лет.
- Обладает бактерицидным и фунгицидным эффектом.



Хлоргексидин



- **2. Гидроксиметилхиноксалиндиоксид (диоксидин)** — лекарственное средство, обладающие широким спектром антибактериальной активности (особенно в отношении анаэробов). Действует бактерицидно.
- Диоксидин эффективен в лечении тяжёлых гнойно-инфекционных процессов. Вместе с тем препарат токсичен, что ограничивает его применение в педиатрии в качестве системного медикамента.
- Возможно развитие лекарственной устойчивости бактерий. При введении характеризуется малой терапевтической широтой, в связи с чем необходимо строгое соблюдение рекомендуемых доз.



ДИОКСИДИН



Результаты



Рисунок 1 – Частота встречаемости мутантов *Pseudomonas putida* под воздействием хлоргексидина






Рисунок 2 – Частота встречаемости мутантов *Pseudomonas putida* под воздействием диоксидина

Анализ влияния антибиотиков

□ Ампициллин:


Ампициллин – полусинтетический антибиотик. Разрушается пенициллиназой. В медицинской практике применяют ампициллин, ампициллина натриевую соль, ампициллина тригидрат.



▣ Тетрациклин:

Тетрациклин – антибиотик из семейства тетрациклинов. Основой молекулы тетрациклиновых антибиотиков является полифункциональное гидронафтаценовое соединение.

Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к нарушению синтеза белка. Активен в отношении как грамотрицательных так и грамположительных бактерий.



Результаты



Рисунок 3 – Частота встречаемости мутантов *Pseudomonas putida* под воздействием тетрациклина





Рисунок 4 – Частота встречаемости мутантов *Pseudomonas putida* под воздействием ампицилина

Анализ влияния солей тяжелых металлов

□ Сульфат меди (II):


Неорганическое соединение, медная соль серной кислоты с формулой CuSO_4 . Нелетучее, не имеет запаха. Сульфат меди (II) — важнейшая из солей меди. Часто служит исходным сырьём для получения других соединений.



□ Хлорид ртути (HgCl_2):

Хлорид ртути — бесцветное кристаллическое растворимое в воде и очень ядовитое соединение.

Применяется для целей наружной дезинфекции как антисептическое средство в растворах для дезинфекции кожи, белья, одежды, предметов ухода за больными, для обмывания стен. Катализатор органического синтеза.



Результаты




Рисунок 5 – Частота встречаемости мутантов *Pseudomonas putida* под воздействием сульфата меди(II)




Рисунок 6 – Частота встречаемости мутантов *Pseudomonas putida* под воздействием хлорида ртути (II)

Анализ влияния пестицидов




□ Клопиралид:

Пестицид, послевсходовый гербицид с высокой гербицидной активностью по отношению к сорнякам, устойчивым к арилоксиалканкарбоновым кислотам и их производным. Имеет вид белых кристаллов. При обычных условиях хранения устойчив. С основаниями образует водорастворимые соли. Длительное действие препарата обеспечивается за счет проникновения действующего вещества в корневую систему.



□ Глифосат:

Пестицид, арборицид, гербицид с широким спектром активности. Обладает избирательным и сплошным действием, применяется для подавления однолетних и многолетних сорняков. В воде устойчив. Уменьшение уровня глифосата в водной системе происходит за счет влияния микрофлоры и в результате воздействия ультрафиолетового излучения



Результаты:



Рисунок 7 – Частота встречаемости мутантов *Pseudomonas putida* под воздействием глифосата




Рисунок 8 – Частота встречаемости мутантов *Pseudomonas putida* под воздействием клопиралида

- Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках научного проекта № 6.2379.2017/ПЧ

Используемая литература:

- Franz J. E. et al. Glyphosate: a unique global herbicide. – American Chemical Society, 1997.
- 2. Ivanović S., Lilić S. Presence of *Campylobacter coli* in slaughtered pigs and its resistance to antibiotics // *Biotechnology in Animal Husbandry*. – 2007. – Т. 23. – №. 5-6-1. – С. 403-410.
- 3. Ампициллин // Википедия. [2017—2017]. Дата обновления: 14.05.2017. URL: <http://ru.wikipedia.org/?oldid=85404583> (дата обращения: 14.05.2017).
- 4. Stewart P. S. Mechanisms of antibiotic resistance in bacterial biofilms // *International Journal of Medical Microbiology*. – 2002. – Т. 292. – №. 2. – С. 107-113.
- 5. Benveniste R., Davies J. Mechanisms of antibiotic resistance in bacteria // *Annual review of biochemistry*. – 1973. – Т. 42. – №. 1. – С. 471-506.
- 6. Хлоргексидин // Википедия. [2018—2018]. Дата обновления: 19.02.2018. URL: <http://ru.wikipedia.org/?oldid=91035315> (дата обращения: 19.02.2018).
- 7. Супотницкий М. В. Механизмы развития резистентности к антибиотикам у бактерий // *Биопрепараты*. – 2011. – №. 2. – С. 4.
- 8. Глифосат // Википедия. [2018—2018]. Дата обновления: 26.01.2018. URL: <http://ru.wikipedia.org/?oldid=90530324> (дата обращения: 26.01.2018).
- 9. Jatsenko T. et al. Molecular characterization of *Rif^r* mutations in *Pseudomonas aeruginosa* and *Pseudomonas putida* // *Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis*. – 2010. – Т. 683. – №. 1. – С. 106-114.
- 10. Ma X. et al. *rpoB* gene mutations and molecular characterization of rifampin-resistant *Mycobacterium tuberculosis* isolates from Shandong Province, China // *Journal of clinical microbiology*. – 2006. – Т. 44. – №. 9. – С. 3409-3412
- 11. Chopra I., Roberts M. Tetracycline antibiotics: mode of action, applications, molecular biology, and epidemiology of bacterial resistance // *Microbiology and*

Благодарим за внимание!

