

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Н. БУРДЕНКО»
МИНЗДРАВА РОССИИ

ИНСТИТУТ СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра организации сестринского дела

Профилактика ВИЧ-инфекции

Научный руководитель: к.м.н., доцент
Полетаева Ирина Алексеевна


Исполнитель:
Ивашова Ульяна Максимовна
студентка 202 группы медико-
профилактического факультета
Синеглазова Александра Сергеевна
студентка 202 группы медико-
профилактического факультета






**Меньше
знаешь-
крепче СПИД!**

Количество новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции у граждан России в 1987-2017 годах



Источник: Федеральный СПИД-центр, Москва, В.В. Покровский.



- Гомосексуальный контакт
- Гетеросексуальный контакт
- Переливание инфицированной ВИЧ крови
- Пребывание в нозокомиальном очаге
- Заражение детей от ВИЧ+ матерей во время беременности, родов и при грудном вскармливании
- Заражение матерей от детей при грудном вскармливании
- Парентеральный контакт при употреблении наркотиков


Задачи:


- 1) проследить историю и причины распространения эпидемии ВИЧ**
- 2) изучить патогенез и морфологию ВИЧ**
- 3) определить специфические аспекты профилактики для медицинских работников**
- 4) рассмотреть основные направления профилактических работ в России**
- 5) с помощью научных фактов «развенчать» основные мифы о ВИЧ-инфекции, бытующие среди населения, и рассмотреть проблему ВИЧ-диссидентства.**











Стадии ВИЧ-инфекции

1. Стадия инкубации (2 недели – 3 месяца, до года)
ИФА «-» «**период окна**»
2. Стадия первичных проявлений
 - А. Бессимптомная
 - Б. Острая стадия ВИЧ-инфекции без вторичных заболеваний
 - В. Острая стадия ВИЧ-инфекции с вторичными заболеваниями
3. Латентная стадия (5-10 лет)
4. Стадия вторичных заболеваний (4А, 4Б, 4В) – 3-5 лет
5. Терминальная стадия (СПИД) – несколько месяцев.



**ВИЧ =
СПИД**







ВИЧ передается:



через сексуальный контакт



при внутривенном употреблении наркотиков



от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов, кормления грудью



в лечебных учреждениях при нарушении норм дезинфекции, стерилизации, заготовки крови и искусственном оплодотворении



при использовании нестерильного инструмента для татуировок, пирсинга, маникюра и педикюра



при использовании чужих бритвенных принадлежностей и зубных щеток

ВИЧ не передается:



при объятиях и дружеских поцелуях



при кашле и чихании



при укусах насекомых и животных



через деньги



во время принятия пищи и при пользовании общей посудой



в общественных местах и транспорте при коллективных занятиях спортом



при пользовании общим туалетом, душем, бассейном



через постельное белье или другие личные вещи



профилактика











16+



ПРОТИВ
СПИДА

**БЕРЕШЬ
КОЛИЧЕСТВОМ?**

**Я ТОЖЕ!
СПИД**

SPID.RU (495) 366 62 38

Департамент здравоохранения города Москвы | Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом

ПРОТИВ
СПИДА

16+

ИЩЕШЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ?



**Я ТОЖЕ!
СПИД**

**SPID.RU
(495) 366 62 38**

Департамент здравоохранения города Москвы | Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом

Бояться не нужно, нужно знать!

Молодежь и СПИД

Зачем рисковать?



В наше молодое поколение, когда кажется жизнь великолепной, исполненной и радостной, ты не задумываешься о реальности этой жизни. Но не рано удивляешься, на свете не стоит такой жизни.

СПИД – вирус иммунодефицита человека, который приводит к развитию СПИДа (синдрому приобретенного иммунодефицита) – смертельно опасному состоянию, к болезни, которая разрушает иммунитет.

Сегодня более 80 млн. человек Земли ВИЧ-инфицированы, а каждый год людей, которые не знают о том, что больны – не может сосчитать никто. Более половины ВИЧ-инфицированных – молодые люди. Лекарств, способных полностью изменить болезнь – не существует!

Симптомы острой стадии заболевания

Более 30 % ВИЧ-инфицированных заражаются впервые половым путем. Ваш партнер беззащитной половой жизнью – попадает в группу риска. Чтобы нам не вернуть прожитую жизнь – случайная связь это просто коварная ловушка обманчивая энергия, яркие впечатления, любовь и тепло, в котором мы все так нуждаемся. Как бы привлекательно не выглядел незнакомый человек, предлагающий вам стать его случайным партнером, вы не можете знать, на сколько болезненно могут стать эти отношения для вашего здоровья. Человек, который поддерживает беспорядочные половые связи, является идеальным носителем вируса, способный инфицировать передавая половым путем.

Симптомы хронической стадии

Даже используя презерватив, нельзя быть уверенным в 100% защите от ВИЧ и других инфекций передающихся половым путем.

Мифы

В России много парней ВИЧ-инфицированы – зарадятся вирусом во время интимных отношений наркотики. Так называемых «чистых» наркотиков не существует, потому что они далеко не так безобидны, как кажутся некоторым. Они становятся стартовой площадкой для внутривенных инъекций и тяжелых наркоманий. А в остальных случаях, как и алкоголь, разрушают систему самоконтроля, делают человека не только обидчивым, но и безразличным, способным на необдуманные поступки, посредством которых, к сожалению, не всегда можно вернуться.

Антиретровирусная терапия

Вы не можете заразиться вирусом через дружеский поцелуй, рукопожатие и обнимашки. Категорически запрещено общие посуды и столовые приборы. Вы можете использовать общие чашки, полотенца или одежду. Так же безопасны донорства и другие медицинские манипуляции в государственных учреждениях.

Секс и профилактика СПИДа

1. Безопасного секса не бывает. Профилактика снижает риск инфицирования лишь на 70-80%. Помните, что даже 1% незащищенности может стоить тебе здоровья на всю будущую жизнь!
2. Самый надежный способ защиты от ВИЧ – верность любимому человеку! Беспорядочные половые связи – один из самых распространенных источников передачи ВИЧ!
3. Если наркотик – это делает вирус в тебе врагом! Даже один раз доверчивый наркотик, ты рискуешь приобрести неизлечимое заболевание!
4. С ВИЧ-инфекцией может столкнуться каждый! Регулярное тестирование на ВИЧ позволяет своевременно выявить болезнь и начать лечение.
5. Нужно не бояться ВИЧ-инфекции, а жить с ней адекватно! Вирус не передается через рукопожатия, поцелуй и укусы кроватных и насекомых.
6. ВИЧ – это не приговор. Если ты ВИЧ-положительный – ты можешь при организации жизни и безопасности обеспечить себя самозащитой.

Кровь можно сдать в поликлиниках по месту жительства или временного пребывания и в Центрах профилактики и борьбы со СПИД.









АПТЕЧКА

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



АНТИ-СПИД

Сторона ответственная

ВІТАЛ

ТОВТІ в МДП 1992/2008,
ТОВТІ в МДП 1992/2008

STOP AIDS







МИФЫ



ВИЧ не передаётся




При рукопожатии




При поцелуях



Через одежду



Через воздух




Через воду



Через пищу



При осмотрах





Животными











**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**