

Период новорожденности -

**Это период от рождения до 1,5 - 2 месяцев
(до момента появления «комплекса
оживления»).**

Это кризисный период



ПЕРИУДЫ НОВОРОЖДЕННОГО

Период новорожденности –
первые 28 дней жизни человека

- ◆ Неонатальный период

- ◆ Ранний (0-7 дней)

- ◆ Поздний (8-28 дней)

Адаптация в период новорожденности

Механизм первого вдоха

Во время схваток происходит отслоение плаценты, нарушается связь между ребенком и мамой

В организме ребенка накапливается CO_2 и развивается недостаточность O_2

Раздражение дыхательного центра. Импульсы идут к дыхательной мускулатуре

Сокращение дыхательной мускулатуры



Ребенок в утробе матери ($t=37^\circ\text{C}$)

Ребенок попадает в окружающую среду ($t=27^\circ\text{C}$)

Сокращение дыхательной мускулатуры

Первый вдох ребенка сопровождается криком

Главные изменения, происходящие в организме ребенка в период новорожденности

- адаптация к новым условиям жизни
- возникновение легочного дыхания
- перестройка аппарата кровообращения
- перестройка желудочно-кишечного тракта
- изменения обмена веществ




Период новорожденности

организация сна и бодрствования

- Создать оптимальные условия для активного бодрствования:
 - Место для переодевания – пеленальный столик
 - Отказаться от полного пеленания ребёнка, так как свободные движения способствуют укреплению мышечного каркаса и полноценному двигательному развитию
 - Одежда свободная (ползунки, распашонки)
 - Ребёнка любого возраста, даже новорождённого, нельзя оставлять на пеленальном столике одного!!

Анамнез периода новорождённости

- Оценка по шкале Апгар
- Данные антропометрии
- Время первого прикладывания к груди и активность сосания
- Переходные состояния
- Время отпадения пуповинного остатка, состояние пупочной ранки
- Состояние кожи: опрелости, потница
- Наличие заболеваний: асфиксия, родовая травма
- День выписки из роддома



Кризис новорожденности



- физическое отделение ребенка от матери;
- внешние раздражители (холод, яркий свет, воздушная среда, другой тип дыхания);

Заключение

- У новорожденных с болезнью Гиршпрунга возможно и целесообразно производить радикальную операцию в периоде новорожденности
- Сложности проведения радикального вмешательства у новорожденного необоснованно преувеличены
- Основные показания к колостомии – некупирующаяся (или рецидивирующая) кишечная непроходимость и тяжелое течение энтероколита
- Колостому предпочтительно накладывать на переходную (транзиторную) зону

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**