

# Степень с целым отрицательным показателем

8 класс

$$\frac{1}{\theta} \int_{R_n} T(x) f(x, \theta) dx = M \left( T(x) \right)$$
$$f_1) = \frac{(\xi_1 - a)}{\sigma^2}$$



# Вспомним:



$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}}$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad a \neq 0$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$b \neq 0$$



**Постараемся ввести степень  
с отрицательным  
показателем так, чтобы  
свойства для степени с  
натуральным показателем  
остались верными и для  
степеней с отрицательными  
показателями.**



Сначала введём степень с показателем 0. Для этого в свойстве 2 положим  $m=n$  :



$$a^m : a^m = a^{m-m} \quad a \neq 0$$

$$1 = a^0$$

ВЫВОД:

$$a^0 = 1 (a \neq 0)$$

Теперь в свойстве 2 положим

$$m=0 :$$

$$a^0 : a^n = a^{0-n}$$

$$a \neq 0$$

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n}$$





определение степени с  
отрицательным показателем:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}}}$$

$$a \neq 0$$





$$\begin{pmatrix} 1 \\ - \\ a \end{pmatrix}^{-n} = a^n$$

$$\begin{pmatrix} a \\ - \\ b \end{pmatrix}^{-n} = \begin{pmatrix} b \\ - \\ a \end{pmatrix}^n$$



# Примеры

$$2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$$

$$(-1,7)^0 = 1$$

$$(0,2)^{-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = (5^{-1})^{-2} = 5^2 = 25$$

$$\left(-1\frac{1}{2}\right)^{-2} = \left(-\frac{3}{2}\right)^{-2} = \left(\left(-\frac{3}{2}\right)^{-1}\right)^2 = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$





Учебник § 13 п.33  
стр. 179 №903, 905, 907,910

Домашнее задание:  
§ 13 п.33  
№ 906, 909, 916



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**