МРАМОРНАЯ АМБИСТОМА

- Мраморная амбистома — крепко сложенная, коренастая саламандра с яркими полосами. У самок полосы скорее серые, у самцов они белее. Взрослые особи вырастают до 11 см, что немного по сравнению с другими представителями рода.

- Мраморные амбистомы встречаются в восточной части США, от юга Новой Англии до севера Флориды, на запад доходят до Иллинойса и Техаса. Их находили также и в Нью-Гэмпшире, хотя там было обнаружено только 2 особи.
- Обитают во влажных лесах, в местах с мягкой и влажной почвой. Для размножения им необходимы сезонно затопляемые пространства, но взрослые саламандры обычно в воду не входят.

- Взрослые большую часть жизни проводят в почве, опавших листьях, но в сезон размножения выходят по ночам на поверхность. Взрослые выходят на поверхность в основном в дождливую погоду или когда идёт первый осенний снег.

- Размножаются осенью, обычно с сентября по декабрь. Самки помещают икринки группами до 120 штук под брёвна или в заросли растительности в низких местах, которые скорее всего затопит во время зимних дождей. Самка выкапывает в мягкой почве небольшое углубление и откладывает туда икринки. Если идут дожди, то личинки вылупляются той же осенью или зимой. Однако они могут и перезимовать, чтобы вылупиться только весной. Личинки вылупляются сразу же после того, как гнездо затопит

- Взрослые едят наземных беспозвоночных: червей, насекомых, многоножек, улиток, слизней. Личинки поедают мелких водных животных (пресноводный зоопланктон), но более крупные особи могут также есть личинок и яйца других амфибий.